

レジメン名	(特発性血小板減少性紫斑病) リツキシマブ	適応	血小板減少性紫斑病
		1クール日数	28日
		上限クール数	なし

【注射】		投与量\day		1	7	8	14	15	21	22	28
《主管①》 生理食塩液【100】mL/瓶 ケモ用キープ 点滴注射	1瓶	●				●		●		●	
<側管①> ■リツキシマブBS点滴静注「KHK」 テルモ糖注5% 500mL/袋 (mL入力) 5%グルコースは1mg/mLとなるように調整 最初の30分は50mg/hr、その後30分毎に 50mg/hrずつ上げて、最大400mg/hrまで。2回 目以降は、初期投与時の副作用が軽微であ れば、100mg/hrで開始し、30分毎に100mg/hr ずつ上げて最大400mg/hr。適宜減速  抗癌剤精密持続点滴注射 (薬剤部調製)	375mg/m2 0.001	●				●		●		●	
<側管②> 生理食塩液【50】mL/瓶 ルートフラッシュ用 点滴注射	1瓶	●				●		●		●	

【内服】		投与量\day		1	7	1	14	1	21	1	28
カロナール錠【200】mg リツキシマブ開始30分前 医師の指示通り (頓服用)	2錠	●				●		●		●	
レスタミンコーワ錠 10mg リツキシマブ開始30分前 医師の指示通り (頓服用)	3錠	●				●		●		●	

血/化療/≤5h

※薬剤費 (1クールあたり) / 体表面積1.5m2

■リツキシマブBS注 100mg	4瓶	¥74,524
■リツキシマブBS注 500mg	4瓶	¥364,840

¥439,364

2021	リツキシマブBS注 100mg	18631
	リツキシマブBS注 500mg	¥91,210