

レジメン名	(慢性リンパ性白血病) R-ベンダムスチン	適応		慢性リンパ性白血病										
		1クール日数		28日										
		上限クール数		6クール										
<b>【注射】</b>		投与量\day		1	2	3	7	8	14	15	21	22	28	
《主管①》 生理食塩液【100】mL/瓶 ケモ用キープ 点滴注射	1瓶	●	●											
<側管①> <b>■リツキシマブBS点滴静注(100/500)▼限定</b> テルモ糖注5% 500mL/袋 (mL入力) <b>5%グルコースは1mg/mLとなるように調整</b> 最初の30分は50mg/hr、その後30分毎に50mg/hrずつ上げて、最大400mg/hrまで。2回目以降は、初期投与時の副作用が軽微であれば、100mg/hrで開始し、30分毎に100mg/hrずつ上げて最大400mg/hr。適宜減速 抗癌剤精密持続点滴注射 (薬剤部調製)	初回 375mg/m <sup>2</sup> 2回目以降 500mg/m <sup>2</sup> 0.001	●												
<側管②> 生理食塩液【50】mL/瓶 ルートフラッシュ用 点滴注射	1瓶	●	●											
<側管③> デキサート注射液【3.3mg】mg・1mL/管 デキサート注射液【1.65mg】mg・0.5mL/管 アロキシン注射液0.75mg/管 生理食塩液【100】mL/瓶 30分かけて 点滴注射	1管 1管 1管 1瓶	●												
<側管④> 生理食塩液【50】mL/瓶 ルートフラッシュ用 点滴注射	1瓶	●	●											
<側管⑤> <b>■トリアキシン注(100)▼限定</b> 注射用水【100】mL/瓶 テルモ生食【250】mL/袋(点滴用) 1時間かけて 1ﾊﾞｲｱﾙあたり40mL(100mg製剤)もしくは 10mL(25mg製剤)の注射用水で溶解し、必要量を生食へ希釈する。 抗癌剤精密持続点滴注射 (薬剤部調製)	90mg/m <sup>2</sup> 1瓶 1袋	●	●											
<側管⑥> 生理食塩液【50】mL/瓶 ルートフラッシュ用 点滴注射	1瓶	●												
<側管⑦> デキサート注射液【3.3mg】mg・1mL/管 デキサート注射液【1.65mg】mg・0.5mL/管 生理食塩液【100】mL/瓶 30分かけて 点滴注射	1管 1管 1瓶		●											
<b>【内服】</b>		投与量\day		1	2	3	7	8	14	15	21	22	28	
カロナール錠【200】mg リツキシマブ開始30分前 医師の指示通り (頓服用)	2錠	●												
レスタミンコーワ錠 10mg リツキシマブ開始30分前 医師の指示通り (頓服用)	3錠	●												
アプレビタントカプセル 125mg 1日1回 点滴の60~90分前	1錠	●												
アプレビタントカプセル 80mg 1日1回 朝食後	1錠		●	●										

アシクロビル・バクタは主治医の判断で内服