

レジメン名	(胃癌) ラムシルマブ+ Weekly アブラキサン (アルミン懸濁型 <sup>ハ</sup> クリタセル)	適応	胃癌
		1クール日数	28日
		上限クール数	なし

【注射】		投与量\day																																					
		1							8							14							15							21		22		28					
<<主薬①>> 生理食塩液【100】mL/瓶 キープ用 点滴注射	1 瓶	●						●																															
<側管> デキサート注射液【6.6】mg・2mL/瓶 ファモチジン静注 20mg・20mL/管 ポラミン注 5mg・1mL/管 生理食塩液【100】mL/瓶 30分かけて 点滴注射 抗がん剤投与30分前までに投与を終了すること	1 瓶 1 管 1 管 1 瓶	●																																					
<側管> デキサート注射液【6.6】mg・2mL/瓶 生理食塩液【100】mL/瓶 30分かけて 点滴注射	1 瓶 1 瓶							●																															
<側管> ■サイラムザ点滴注射液 (100/500) 生理食塩液【250】mL/袋 1時間かけて 抗癌剤点滴注射(薬剤調製)*45	8mg/kg 1 袋	●																		●																			
フィルター付輸液セット サイラムザのみフィルター使用してください。 アブラキサンには使用しないでください。		●						●						●																									
<側管> 生理食塩液【50】mL 1時間かけて 経過観察用(1時間かけて:省略可) フラッシュ用	1 瓶	●																		●																			
<側管> ■アブラキサン点滴静注用 (アルミン懸濁型 <sup>ハ</sup> クリタセル) 生理食塩液【50】mL/瓶 30分かけて 注意:投与時インラインフィルター を使用しないこと ※調製は、100mgあたり20mLで溶解 (溶解後は生食等に混和しないこと) 抗癌剤点滴注射(薬剤調製)閉鎖式	100mg/m2 1 瓶	●						●						●																									
生理食塩液【50】mL/瓶 フラッシュ用 点滴注射	1 瓶	●						●						●																									

胃/化療/≦3h    胃/化療/≦1h    胃/化療/≦3h