

レジメン名	(大腸癌) C A P I R I	適応	大腸癌
		1クール日数	21日
		上限クール数	なし

【注射】		投与量\day	1				7	8					14	15					21
<<主管①>> 生理食塩液【100】mL/瓶 キープ用 点滴注射	1瓶	●																	
<側管①> デキサート注射液【3.3】mg・1mL/管 デキサート注射液【1.65】mg・0.5mL/管 アロキシ静注 0.75mg・5mL/瓶 生理食塩液【100】mL/瓶 30分かけて 点滴注射	1管 1管 1瓶 1瓶	●																	
<側管②> 生理食塩液【50】mL/瓶 フラッシュ用 点滴注射	1瓶	●																	
<側管③> ■イリノテカン塩酸塩点滴静注液「イリカ」 (40/100) テルモ糖注5% 500mL/袋 2時間かけて 抗癌剤点滴注射(薬剤調製)閉鎖式	200mg/m2 1袋	●																	
<側管④> 生理食塩液【50】mL/瓶 フラッシュ用 点滴注射	1瓶	●																	

【内服】		投与量/day	1	2	3			7	8					14	15					21
アプレピタントカプセル 125mg 1日1回 点滴の60~90分前	1錠	●																		
アプレピタントカプセル 80mg 1日1回 朝 食後	1錠	●		●	●															

【内服】		投与量/day	1					7	8					14	15					21
■カペシタビン錠 300mg 1日2回 朝 夕 食後	mg	●	→																	
ピドキサル錠 20mg 1日3回 朝 昼 夕 食後	3錠	●	→																	

ピドキサル錠は、主治医の判断
腸/化療/≤3h

カペシタビン	
体表面積	初回基準量
~1.31m2未満	900mg/回(×2)
1.31m2以上~1.69m2未満	1,200mg/回(×2)
1.69m2以上~2.07m2未満	1,500mg/回(×2)
2.07m2以上~	1,800mg/回(×2)