

レジメン名	(大腸癌) ベバシズマブ+XELOX	適応	大腸癌
		1クール日数	21日
		上限クール数	なし

【注射】		投与量\day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
<<主管①>> 生理食塩液【100】mL/瓶 キープ用 点滴注射	1 瓶		●																				
<側管①> ■アバステン点滴静注用 (100/400) 生理食塩液【100】mL/瓶 90分かけて 抗癌剤点滴注射(薬剤調製)	7.5mg/kg 1 瓶		●																				
<側管②> 生理食塩液【50】mL/瓶 フラッシュ用 点滴注射	1 瓶		●																				
<側管③> デキサート注射液【6.6】mg・2mL/瓶 ラモセトロン注射液 0.3mg・2mL/管 生理食塩液【100】mL/瓶 30分かけて 点滴注射	1 瓶 1 管 1 瓶		●																				
<側管④> ■オキサリプラチン注(50/100) デキサート注射液【3.3】mg・1mL/管 大塚糖液【5% 250mL】/瓶 2時間かけて 抗癌剤点滴注射(薬剤調製)	130mg/m <sup>2</sup> 1 管 1 瓶		●																				
<側管⑤> 生理食塩液【50】mL/瓶 フラッシュ用 点滴注射	1 瓶		●																				

【内服】		投与量\day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
■カペシタン錠 300mg 1日2回 朝 夕 食 後	mg		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ピドキサル錠 20mg 1日3回 朝 昼 夕 食 後	3 錠		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
デカドロン錠 4mg 1日2回 朝 夕 食 後	2 錠		●	●																			

ピドキサル錠は、主治医の判断

腸/化療/≤4h

カペシタン錠	
体表面積	1回用量
~1.36m <sup>2</sup> 未満	1,200mg/回(×2)
1.36m <sup>2</sup> 以上~1.66m <sup>2</sup> 未満	1,500mg/回(×2)
1.66m <sup>2</sup> 以上~1.96m <sup>2</sup> 未満	1,800mg/回(×2)
1.96m <sup>2</sup> 以上~	2,100mg/回(×2)