

レジメン名	(関節リウマチ) インフリキシマブ初回導入	適応	関節リウマチ
		1クール日数	70日
		上限クール数	なし

【注射】		投与量\day	1	7	8	14	15	21	22	28
《主管①》										
生理食塩液【100】mL/瓶 ルートキープ用 点滴注射	1瓶		●				●			
<側管①>										
■インフリキシマブBS 点滴静注用「NK」	3mg/kg (上限10mg/kg)		●				●			
テルモ生食【250】mL/袋(点滴用) 開始時80ml/hr、60分後160ml/hr 2時間以上かけて 点滴注射(薬剤調製)	1袋									
【内服】			1	7	8	14	15	21	22	28
カロナール錠 200mg 発熱時 3日分			●							
セチリジン塩酸塩錠 10mg (ジルテック) かゆい時 3日分			●							
アタラックス錠 10mg 医師の指示通り(頓服用)			●							

【注射】		投与量\day	29	35	36	42	43	49	50	70
《主管①》										
生理食塩液【100】mL/瓶 ルートキープ用 点滴注射	1瓶						●			
<側管①>										
■インフリキシマブBS 点滴静注用「NK」	3mg/kg (上限10mg/kg)						●			
テルモ生食【250】mL/袋(点滴用) 開始時80ml/hr、60分後160ml/hr 2時間以上かけて 点滴注射(薬剤調製)	1袋									略
【内服】			29	35	36	42	43	49	50	70
カロナール錠 200mg 発熱時 3日分										
セチリジン塩酸塩錠 10mg (ジルテック) かゆい時 3日分										
アタラックス錠 10mg 医師の指示通り(頓服用)										

関節リウマチ/化療/≦3h