

レジメン名	(乳癌) トラスツズマブ+Weeklyパクリタキセル +カペシタビンA法	適応		乳癌						
		1クール日数		28日						
		上限クール数		なし						
【注射】		投与量\day	1	7	8	14	15	21	22	28
<<主管①>> 生理食塩液【100】mL/瓶 キープ用 点滴注射		1瓶	●		●		●		●	
<側管①> デキサート注射液【6.6】mg・2mL/瓶(デカトロン) ファモチジン静注 20mg・20mL/管 生理食塩液【100】mL/瓶 30分かけて 点滴注射		1瓶 1管 1瓶	●		●		●			
<側管②><側管①(day22)> ■トラスツズマブBS点滴静注用「NK」(60/150) 注射用水【20】mL/管 テルモ生食【250】mL/袋(点滴用) 初回は90分かけて 2回目以降は1時間かけて、忍容性が良好であれば30分でも可 60mg/イアルは3.0mL、150mg/イアルは7.2mLの 注射用水で溶解 21mg/mLとなる 抗癌剤点滴注射(薬剤調製)		初回 4mg/kg 2回目以降 2mg/kg 1~2管 1袋	●		●		●		●	
<側管③><側管②(day22)> 生理食塩液【50】mL/瓶 フラッシュ用 点滴注射		1瓶	●		●		●		●	
<側管④> ■パクリタキセル注射液(タソール)(30/100) グドウ糖液【5% 250mL】/瓶 2時間かけて(忍容性が確認できれば1時間で投与可) 抗癌剤点滴注射(薬剤調製)		80mg/m ² 1瓶	●		●		●			
フィルター付輸液セット			●		●		●			
<側管⑤> 生理食塩液【50】mL/瓶 フラッシュ用 点滴注射		1瓶	●		●		●			
【内服】		投与量\day	1	7	8	14	15	21	22	28
フロベン錠 40mg セレスターナ錠 医師の指示通り(頓服用) 早急 トラスツズマブ開始30分前に内服		1錠 1錠	●		●		●		●	
レスタミンコーワ錠 10mg 医師の指示通り(頓服用) 早急 パクリタキセル投与30分前に内服		5錠	●		●		●			
【内服】		投与量\day	1	7	8	14	15	21	22	28
■カペシタビン錠 300mg 1日2回 朝 夕 食 後		mg	●		●		●		●	
ビドキサル錠 20mg 1日3回 朝 昼 夕 食 後		3錠	●		●		●		●	

ビドキサル錠は、主治医の判断で必要に応じて服用します。

乳/化療/≤5h 乳/化療/≤5h 乳/化療/≤5h 乳/化療/≤3h

カペシタビン	
体表面積	1回用量
~1.31m ² 未満	900mg/回(×2)
1.31m ² 以上~1.64m ² 未満	1,200mg/回(×2)
1.64m ² 以上~	1,500mg/回(×2)