

レジメン名	(非ホジキンリンパ腫) FCR <内服>	適応		非ホジキンリンパ腫											
		1クール日数		28日											
		上限クール数													
【注射】		投与量\day		1	2	3	4	5	6	7	8	15	22	28	
《主管①》 生理食塩液【100】mL/瓶 ケモ用キープ 点滴注射	1瓶	●													
<側管①> ■リツキシマブBS点滴静注「KHK」 テルモ糖注5% 500mL/袋 (mL入力) 5%グルコースは1mg/mLとなるように調整 最初の30分は50mg/hr、その後30分毎に50mg/hrずつ 上げて、最大400mg/hrまで。2回目以降は、初期投与 時の副作用が軽微であれば、100mg/hrで開始し、30 分毎に100mg/hrずつ上げて最大400mg/hr。適宜減速 抗癌剤精密持続点滴注射 (薬剤部調製)	375mg/m2 0.001 mL	●													
<側管②> 生理食塩液【50】mL/瓶 ルートフラッシュ用 点滴注射	1瓶	●													
【内服】		投与量\day		1	2	3	4	5			8	15	22	28	
フルダラ錠 10mg	用法・用量は医師指示による	●	●	●											
エンドキサン錠 50mg	用法・用量は医師指示による	●	●	●											
カロナール錠【200】mg リツキシマブ開始30分前 医師の指示通り (頓服用)	2錠	●													
レスタミンコーワ錠 10mg リツキシマブ開始30分前 医師の指示通り (頓服用)	3錠	●													

血/化療/≤5h