

レジメン名	(多発性骨髄腫)Kd療法週1回投与	適応	多発性 骨髄腫
		1クール日数	28日
		上限クール数	12

【注射】	投与量\day	1	8	15	22	28
<<主管①>> 5%ブドウ糖液【100】mL/瓶 キープ用 点滴注射	1瓶	●	●	●		
<側管①> デキサト注射【6.6】mg・2mL/瓶(デカトロン) 生理食塩液【50】mL/瓶 30分かけて 点滴注射	5瓶 1瓶	●	●	●		
<側管②> 5%ブドウ糖液【50】mL/瓶 フラッシュ用 点滴注射	1瓶	●	●	●		
<側管③> ■カiproリス点滴静注用(10/40)  注射用水【100】mL/瓶 5%ブドウ糖液【100】mL/瓶 30分かけて 1バイアルあたり20mL(40mg製剤)もしくは 5mL(10mg製剤)の注射用水で溶解し、必要量を 5%ブドウ糖液へ希釈する。 抗癌剤点滴注射(薬剤調製)閉鎖式	初回 20mg/m <sup>2</sup> 以降 70mg/m <sup>2</sup> 1瓶 1瓶	●	●	●		
<側管④> 5%ブドウ糖液【50】mL/瓶 フラッシュ用 点滴注射	1瓶	●	●	●		

血/化療/≤1h

【内服】		1	8	15	22	28
■レナデックス錠 4mg 1日1回 朝食後	10錠				●	

day22のレナデックス錠はday15に院外処方