

レジメン名	(大腸癌) C A P I R I + ベバシズマブ	適応	大腸癌
		1クール日数	21日
		上限クール数	なし

【注射】		投与量/day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
<<主管①>> 生理食塩液【100】mL/瓶 キープ用 点滴注射		1 瓶	●																				
<側管①> ■アバステン点滴静注用(100/400) 生理食塩液【100】mL/瓶 90分かけて 初回の忍容性が良ければ、2回目以降は 30分で投与可能 抗癌剤点滴注射（薬剤調製）*45		7.5mg/kg 1 瓶	●																				
<側管②> 生理食塩液【50】mL/瓶 フラッシュ用 アバステンの後 点滴注射		1 瓶	●																				
<側管③> デキサート注射液【3.3】mg・1mL/管 デキサート注射液【1.65】mg・0.5mL/管 アロキシ静注 0.75mg・5mL/瓶 生理食塩液【100】mL/瓶 30分かけて 点滴注射		1 管 1 管 1 瓶 1 瓶	●																				
<側管④> 生理食塩液【50】mL/瓶 フラッシュ用 イリノテカンの前 点滴注射		1 瓶	●																				
<側管⑤> ■イリノテカン塩酸塩点滴静注「タイタ」 (40/100) テルモ糖注5% 500mL/袋 2時間かけて 抗癌剤点滴注射（薬剤調製）閉鎖式		200mg/m2 1 袋	●																				
<側管⑥> 生理食塩液【50】mL/瓶 フラッシュ用 イリノテカンの後 点滴注射		1 瓶	●																				

【内服】		投与量/day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
アプレビタントカプセル 125mg 1日1回 点滴の60～90分前		1 錠	●																				
アプレビタントカプセル 80mg 1日1回 朝 食 後		1 錠		●	●																		

【内服】		投与量/day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
■カペシタビン錠 300mg 1日2回 朝 夕 食 後		mg	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ピドキサール錠 20mg 1日3回 朝 昼 夕 食 後		3 錠	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

ピドキサール錠は、主治医の判断

腸/化療/≤5h

カペシタビン	
体表面積	初回基準量
～1.31m2未満	900mg/回 (×2)
1.31m2以上～1.69m2未満	1,200mg/回 (×2)
1.69m2以上～2.07m2未満	1,500mg/回 (×2)
2.07m2以上～	1,800mg/回 (×2)