

| | | | |
|-------|-----------------------------|--------|--------|
| レジメン名 | (多発性骨髄腫) DLd療法1~2サイクル(1~8週) | 適応 | 多発性骨髄腫 |
| | | 1クール日数 | 28日 |
| | | 上限クール数 | 2 |

| 【注射】 | | 投与量\day | 1 | 7 | 8 | 14 | 15 | 21 | 22 | 28 |
|--|------------------------------|---------|---------------|---|---|----|----|----|----|-------------------------------|
| <<主管①>> 生理食塩液【100】mL/瓶 キープ用 点滴注射 | 1 瓶 | | ● | | ● | | ● | | ● | |
| <側管①> デキサート注射液【6.6】mg・2mL/瓶 生理食塩液【100】mL/瓶 30分かけて ダラザレックスの投与1時間前に投与開始する 点滴注射 | 5 瓶 1 瓶 | | ● | | ● | | ● | | ● | |
| <側管②> 生理食塩液【50】mL/瓶 フラッシュ用 点滴注射 | 1 瓶 | | ● | | ● | | ● | | ● | |
| <側管③> ■ダラザレックス点滴静注(100/400) 生理食塩液バッグ「フソー」【1000】mL/袋 希釈後の総量を1000mLとし、50mL/時で開始する。 忍容性が良好であれば、別表の通り希釈後の総量、投与速度を変更可 | 初回 16mg/kg 0.001 mL | | ● (1サイクル目) | | | | | | | |
| <側管③> ■ダラザレックス点滴静注(100/400) テルモ生食【500】mL/袋(点滴用) 希釈後の総量を500mLとし、50mL/時で開始する。 忍容性が良好であれば、別表の通り希釈後の総量、投与速度を変更可 | 2回目以降 16mg/kg 0.001 mL | | ● (2サイクル目) | | ● | | ● | | ● | |
| <側管④> 生理食塩液【50】mL/瓶 フラッシュ用 点滴注射 | 1 瓶 | | ● | | ● | | ● | | ● | |
| フィルター付輸液セット | | | ● | | ● | | ● | | ● | |
| | | | | | | | | | | 初回→血/化療/≤8h 2回目以降→血/化療/≤5h |
| 【内服】 | | 投与量\day | 1 | 7 | 8 | 14 | 15 | 21 | 22 | 28 |
| レブラミドカプセル5mg 1日1回 経口投与 | 5 カプセル | | ● | | ● | | ● | | ● | |
| カロナール錠200mg レスタミン錠10mg ダラザレックスの1時間前(院内処方) | 2 錠 3 錠 | | ● | | ● | | ● | | ● | |

| | | | |
|-------|------------------------------|--------|--------|
| レジメン名 | (多発性骨髄腫) DLd療法3~6サイクル(9~24週) | 適応 | 多発性骨髄腫 |
| | | 1クール日数 | 28日 |
| | | 上限クール数 | 4 |

| 【注射】 | 投与量\day | 1 | 7 | 8 | 14 | 15 | 21 | 22 | 28 |
|---|-------------------------|---|---|---|----|----|----|----|----|
| <<主管①>> 生理食塩液【100】mL/瓶 キープ用 点滴注射 | 1 瓶 | ● | | | | ● | | | |
| <側管①> デキサート注射液【6.6】mg・2mL/瓶 生理食塩液【100】mL/瓶 30分かけて ダラザレックスの投与1時間前に投与開始する 点滴注射 | 5 瓶 1 瓶 | ● | | | | ● | | | |
| <側管②> 生理食塩液【50】mL/瓶 フラッシュ用 点滴注射 | 1 瓶 | ● | | | | ● | | | |
| <側管③> ■ダラザレックス点滴静注(100/400) テルモ生食【500】mL/袋(点滴用) 希釈後の総量を500mLとし、50mL/時で開始する。 忍容性が良好であれば、別表の通り希釈後の総量、投与速度を変更可 | 16mg/kg 0.001 mL | ● | | | | ● | | | |
| <側管④> 生理食塩液【50】mL/瓶 フラッシュ用 点滴注射 | 1 瓶 | ● | | | | ● | | | |
| フィルター付輸液セット | | ● | | | | ● | | | |

2回目以降→血/化療/≤5h

| 【内服】 | 投与量\day | 1 | 7 | 8 | 14 | 15 | 21 | 22 | 28 |
|---|------------|---|---|---|----|----|----|----|----|
| レブラミドカプセル5mg 1日1回 経口投与 | 5 カプセル | ● | | | | | | | |
| レナデックス錠4mg 1日1回 経口投与 | 10 錠 | | | ● | | | | ● | |
| カロナール錠200mg レスタミン錠10mg ダラザレックスの1時間前(院内処方) | 2 錠 3 錠 | ● | | | | ● | | | |

day1に院内処方

| | | | |
|-------|-------------------------------|--------|--------|
| レジメン名 | (多発性骨髄腫) DLd療法7サイクル以降 (25週以降) | 適応 | 多発性骨髄腫 |
| | | 1クール日数 | 28日 |
| | | 上限クール数 | なし |

| 【注射】 | | 投与量\day | 1 | 7 | 8 | 14 | 15 | 21 | 22 | 28 |
|---|-------------------------|---------|---|---|---|----|----|----|----|----|
| <<主管①>> 生理食塩液【100】mL/瓶 キープ用 点滴注射 | 1 瓶 | | ● | | | | | | | |
| <側管①> デキサート注射液【6.6】mg・2mL/瓶 生理食塩液【100】mL/瓶 30分かけて ダラザレックスの投与1時間前に投与開始する 点滴注射 | 5 瓶 1 瓶 | | ● | | | | | | | |
| <側管②> 生理食塩液【50】mL/瓶 フラッシュ用 点滴注射 | 1 瓶 | | ● | | | | | | | |
| <側管③> ■ダラザレックス点滴静注 (100/400) テルモ生食【500】mL/袋 (点滴用) 希釈後の総量を500mLとし、50mL/時で開始する。忍容性が良好であれば、別表の通り希釈後の総量、投与速度を変更可 | 16mg/kg 0.001 mL | | ● | | | | | | | |
| <側管④> 生理食塩液【50】mL/瓶 フラッシュ用 点滴注射 | 1 瓶 | | ● | | | | | | | |
| フィルター付輸液セット | | | ● | | | | | | | |

| 【内服】 | | 投与量\day | 1 | 7 | 8 | 14 | 15 | 21 | 22 | 28 |
|--|------------|---------|---|---|---|----|----|----|----|----|
| レブラミドカプセル5mg 1日1回 経口投与 | 5 カプセル | | ● | | | | | | | |
| レナデックス錠4mg 1日1回 経口投与 | 10 錠 | | | | ● | | ● | | ● | |
| カロナール錠200mg レスタミン錠10mg ダラザレックスの1時間前 (院内処方) | 2 錠 3 錠 | | ● | | | | | | | |

day1に院内処方