		適応	関節リウマチ
レジメン名	(関節リウマチ) アバタセプト初回導入	1クール日数	56
		上限クール数	なし

【注射】	投与量∕day	1		T	7	8			14	1 15	5	П	21	2	22	П	П	2	8
≪主管①≫ 生理食塩液【100】m L/瓶(点滴用) キープ用 点滴注射	1 瓶	•								•	,								
<側管①> ■オレンシア点滴静注用250mg/批 1瓶あたり10mLの生理食塩液で溶解 生食【100m L】/本 30分かけて 点滴注射(薬剤部調製)	60kg>:500mg/body 60kg≦BW≦100kg:750mg/body 100kg<:1000mg/body	•								•)								
フィルター付輸液セット		•								•)								
<側管②> 生理食塩液【50】mL/瓶 ルートフラッシュ用 点滴注射	1 瓶	•								•	•								
F. > 413			_	 _	1		 _	1 1	_					_	_	-	_	_	_
【注射】	投与量∕day	29			35	36			42	2 43	3		49) [5	50			5	6
【注射】 《主管①≫ 生理食塩液【100】m L/瓶(点滴用) キープ用 点滴注射	投与量√day 1 瓶	•			35	36			42	2 43	3		49	9 5	50			5	66
≪主管①≫ 生理食塩液【100】m L/瓶(点滴用) キープ用 点滴注射 <側管①> ■オレンシア点滴静注用250mg/批 1瓶あたり10mLの生理食塩液で溶解 生理食塩液【100】m L/瓶(点滴用) 30分かけて 点滴注射(薬剤部調製)	1 瓶	•			35	36			42	22 43	3		49		50			5	56
≪主管①≫ 生理食塩液【100】m L/瓶(点滴用) キープ用 点滴注射 <側管①> ■オレンシア点滴静注用250mg/搭 1瓶あたり10mLの生理食塩液で溶解 生理食塩液【100】m L/瓶(点滴用) 30分かけて	1 瓶 60kg>:500mg/body 60kg≦BW≦100kg:750mg/body 100kg<:1000mg/body				35	36			42	2 43	3		49		50			5	