

レジメン名	(マントル細胞リンパ腫) R-ベンダムスチン液 (BS:リツキシマブ)	適応		マントル細胞リンパ腫							
		1クール日数	28日		28日						
		上限クール数	6クール								
【注射】	投与量\day	1	2	3	7	8	14	15	21	22	28
《主管①》 生理食塩液【100】mL/瓶 ケモ用キープ 点滴注射	1 瓶	●	●								
<側管①> デキサート注射液【3.3mg】mg・1mL/管 デキサート注射液【1.65mg】mg・0.5mL/管 パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg・50mL/袋 15分かけて 点滴注射	1 管 1 管 1 袋	●									
<側管②> 生理食塩液【50】mL/瓶 ルートフラッシュ用 点滴注射	1 瓶	●	●								
<側管③> ■リツキシマブBS点滴静注「KHK」 テルモ生食 500mL/袋 (mL入力) 又は生理食塩液パック「ツ」【1】L (mL入力) 生食は1mg/mLとなるように調整 最初の30分は50mg/hr、その後30分毎に50mg/hrずつ上げて、最大400mg/hrまで。2回目以降は、初期投与時の副作用が軽微であれば、100mg/hrで開始し、30分毎に100mg/hrずつ上げて最大400mg/hr。適宜減速 抗癌剤精密持続点滴注射 (薬剤部調製)	375mg/m2 0.001	●									
<側管④> 生理食塩液【50】mL/瓶 ルートフラッシュ用 点滴注射	1 瓶	●									
<側管⑤> ■トレアキシ点静注液(100) テルモ生食【250】mL/袋(点滴用) 1時間かけて 抗癌剤精密持続点滴注射 (薬剤部調製)	90mg/m2 1 袋	●	●								
<側管⑥> 生理食塩液【50】mL/瓶 ルートフラッシュ用 点滴注射	1 瓶	●	●								
<側管⑦> デキサート注射液【3.3mg】mg・1mL/管 デキサート注射液【1.65mg】mg・0.5mL/管 生理食塩液【100】mL/瓶 30分かけて 点滴注射	1 管 1 管 1 瓶		●								
【内服】	投与量\day	1	2	3	7	8	14	15	21	22	28
カロナール錠【200】mg リツキシマブ開始30分前 医師の指示通り (頓服用)	2 錠	●									
レスタミンコーワ錠 10mg リツキシマブ開始30分前 医師の指示通り (頓服用)	3 錠	●									
アプレピタントカプセル 125mg 1日1回 点滴の60~90分前	1 錠	●									
アプレピタントカプセル 80mg 1日1回 朝食後	1 錠		●	●							

アシクロビル・バクタは主治医の判断で内服