

運動負荷心筋シンチの中止薬剤について(有効日:2023年04月03日～)

		先発医薬品名	一般名(＝後発品名)	当院採用品 (採用区分問わず)	中止時間	備考
β 遮断薬	内服薬	インデラル	プロプラノロール	○	検査前日夕方より中止を考慮 (継続したまま検査する ケースあり)	反応性が劣り、 診断精度が低下
		アドビオール	ベフェトロール	×		
		ナディック	ナドロール	×		
		カルビスケン	ピンドロール	○		
		ミケラン	カルテオロール	○		
		セロケン	メトプロロール	○		
		ロプレソール				
		テノーミン	アテノロール	○		
		メインテート	ビソプロロール	○		
		ケルロング	ベタキソロール	○		
		セレクトール	セリプロロール	○		
		トランデート	ラベタロール	○		
		アーチスト	カルベジロール	○		
		カルバン	ベバントロール	×		
		ローガン	アモスラロール	○		
		アロチノロール	アロチノロール	○		
		ハイパジール	ニブラジロール	×		
その他の内服薬	内服薬				当日朝より中止	当日朝絶食のため
狭心症治療外用薬	貼用薬	フランドールテープ	硝酸イソソルビド	○	検査前日夕方より中止	反応性が劣り、 診断精度が低下
		ニトロダームTTS	ニトログリセリン	○		
		ミリステープ		○		
		ビソノテープ	ビソプロロール	○		

※治療上内服必要な薬に関しては、オーダー医師の判断とする。

※不明な点は、オーダー医師に確認する。

2009/12/01 作成
2012/04/20 改訂
2016/04/01 改訂
2023/03/14 改訂