

レジメン名	(尿路上皮癌) カルボプラチン+ゲムシタビン	適応	尿路上皮癌
		1クール日数	28日
		上限クール数	なし

【注射】	投与量\day	1	7	8	14	15	21	22	28
<<主管①>> 生理食塩液【100】mL/瓶 ケモ用ルートキープ 点滴注射	1瓶	●		●		●			
<側管> デキサート注射液【3.3】mg・1mL/管(テ'カト'ロン) デキサート注射液【1.65】mg・0.5mL/管(テ'カト'ロン) アロキシ静注 0.75mg・5mL/瓶 生理食塩液【100】mL/瓶 30分かけて 点滴注射	1管 1管 1瓶 1瓶	●							
<側管> デキサート注射液【6.6】mg・2mL/管(テ'カト'ロン) 生理食塩液【100】mL/瓶 30分かけて 点滴注射	1瓶 1瓶			●		●			
<側管> ■カルボプラチン点滴静注液「NK」 (50/150/450) テルモ生食【500】mL/袋(点滴用) 1時間かけて 抗癌剤点滴注射(薬剤調製)	AUC4 1瓶	●							
<側管> 生理食塩液【50】mL/瓶 点滴注射 ルートフラッシュ用 カルボプラチンの後 ゲムシタビンの前	1瓶	●							
<側管> ■ゲムシタビン点滴静注用「ヤルト」 (200/1000) ブドウ糖液【5%100】mL/瓶 30分かけて 抗癌剤点滴注射(薬剤調製)	800mg/m2 1瓶	●		●		●			
<側管> YDソリタ T3 200mL ソルメルコート【125】mg/瓶(溶解液付) 1時間かけて 点滴注射	1瓶 1瓶	●		●		●			

泌/化療/≤3h

泌/化療/≤2h

【内服】		1	2	3	4	5	6	7	8	14	15	21	22	28
アプレピタントカプセル 125mg 1日1回 点滴の60~90分前	1C	●												
アプレピタントカプセル 80mg 1日1回 朝 食後	1C		●	●										