

レジメン名	(乳癌) トラスツズマブ+Weeklyドセタキセル	適応				乳癌															
		1クール日数				28日															
		上限クール数				なし															
【注射】		投与量\day				1		7	8		14	15		21	22		28				
<<主管①>> 生理食塩液【100】mL/瓶 血管確保用・フラッシュ用 点滴注射		1瓶					●					●					●				
<側管①> デキサート注射液【6.6】mg・1mL/瓶(デカトロ) 生理食塩液【100】mL/瓶 30分かけて 点滴注射		1瓶 1瓶					●					●					●				
<側管②><day22は側管①> ■トラスツズマブBS点滴静注用 (60/150) 注射用水【20】mL/管 テルモ生食【250】mL/袋(点滴用) 初回は90分かけて 2回目以降は忍容性が良好であれば1時間から30分かけて 60mg ¹ 17mLは3.0mL、150mg ¹ 17mLは7.2mLの注射用水で溶解 21mg/mLとなる 抗癌剤点滴注射(薬剤調製)		初回 4mg/kg 2回目以降 2mg/kg 1~2管 1袋					●					●					●				
<側管③> 生理食塩液【50】mL/瓶 フラッシュ用 トラスツズマブの後、ドセタキセルの前 点滴注射		1瓶					●					●					●				
<側管④> ■ドセタキセル注射液 (20/80) テルモ糖注5% 500mL/袋 2時間かけて 抗癌剤点滴注射(薬剤調製)		25mg/m2 1瓶					●					●					●				
<側管⑤><day22は側管③> 生理食塩液【50】mL/瓶 フラッシュ用 点滴注射		1瓶					●					●					●				
【内服】		投与量\day				1		7	8		14	15		21	22		28				
フロベニ錠 40mg セレスターナ配合錠 医師の指示通り(頓服用) 早急 トラスツズマブ開始30分前に内服		1錠 1錠					●					●					●				

乳/化療/≤4h

乳/化療/≤4h

乳/化療/≤4h

乳/化療/≤3h