

Ccr < 30mL/min の場合は適用不可

レジメン名	(PCNSL) R-MPV療法 ◆day 1	適応	中枢神経系原発悪性リンパ腫
		1クール日数	14日
		上限クール数	5(7)クール

使用禁忌薬剤：NSAIDs, プロトンポンプインヒビター, 利尿剤（フロセミド, チアジド系）
 フェニトイン, スルファメトキサゾール・トリメトプリム, ピペラシリンナトリウム
 テトラサイクリン, シプロフロキサシン など

★メソトレキセート血中濃度測定: Day4～Day5 10時 次を示す値を下回ること
 ⇒ 48hr値: 1×10^{-6} mol/L (1 μ M) ・ 72hr値: 1×10^{-7} mol/L (0.1 μ M)
 ★測尿 および 尿 pH チェックは Day2～Day4 まで

【注射】		投与量\day													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<<主管①>> 生理食塩液【100】mL/瓶 血管確保・フラッシュ用 点滴注射		1 瓶	●												
<側管①> ■リツキシマブBS点滴静注「KHK」 テルモ生食 500mL/袋 (mL入力) 又は生理食塩液パック「フー」【1】L (mL入力) 生食1mg/mLとなるように調製 最初の30分は50mg/hr、その後30分毎に 50mg/hrずつ上げて最大400mg/hrまで。 2回目以降は、初期投与時の副作用が軽微 であれば100mg/hrで開始し、30分毎に 100mg/hrずつ上げて最大400mg/hr。適宜減速 抗癌剤点滴注射（薬剤調製）		375mg/m ² 0.001 mL	●												
<側管②> 生理食塩液【50】mL/瓶 フラッシュ用 点滴注射		1 瓶	●												

【内服】		投与量\day													
カロナール錠【200】mg リツキシマブ開始30分前 医師の指示通り（頓服用）		2 錠	●												
レスタミンコーワ錠 10mg リツキシマブ開始30分前 医師の指示通り（頓服用）		3 錠	●												

レジメン名	(PCNSL) R-MPV療法 ◆day 2	適応		中枢神経系原発悪性リンパ腫													
		1クール日数		14日													
		上限クール数		5(7)クール													
使用禁忌薬剤: NSAIDs, プロトンポンプインヒビター, 利尿剤(フロセミド, チアジド系) フェニトイン, スルファメトキサゾール・トリメトプリム, ピペラシリンナトリウム テトラサイクリン, シプロフロキサシン など																	
★メソトレキセート血中濃度測定: Day4~Day5 10時 次を示す値を下回ること ⇒ 48hr値: $1 \times 10^{-6} \text{mol/L}$ ($1 \mu \text{M}$)・72hr値: $1 \times 10^{-7} \text{mol/L}$ ($0.1 \mu \text{M}$) ★測尿 および 尿 pH チェックは Day2~Day4 まで																	
【注射】		投与量\day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
《主管①》 ソルデム3A輸液【500】mL/袋 メイロン静注8.4% 20mL/管 1時~5時 点滴注射		1袋 1管		●													
《主管②》 ソルデム3A輸液【500】mL/袋 メイロン静注8.4% 20mL/管 5時~9時 点滴注射		1袋 1管		●													
《主管③》 ソルデム3A輸液【500】mL/袋 メイロン静注8.4% 20mL/管 9時~13時 点滴注射		1袋 1管		●													
<側管①> ダイアモックス注射用500mg 生理食塩液【100】mL/瓶 9時 30分かけて 点滴注射		1瓶 1瓶		●													
<側管②> デキサート注射液【6.6】mg・1mL/瓶(デカトロン) デキサート注射液【3.3】mg・1mL/管(デカトロン) パロノセトロン点滴バッグ 0.75mg・50mL/袋 9時30分 15分かけて オンコビンの前 点滴注射		1瓶 1管 1袋		●													
<側管③> ■オンコビン注(1)▼限定 生理食塩液【50】mL/袋 9時45分 1回2mg限度 全開で 抗癌剤点滴注射(薬剤調製)		1.4mg/m ² 1袋		●													
<側管④> 生理食塩液【50】mL/袋 フラッシュ用 オンコビンの後、メソトレキセートの前 点滴注射		1袋		●													
<側管⑤> ■注射用メソトレキセート(200mg・1g) テルモ生食 500mL/袋 10時~13時 抗癌剤点滴注射(薬剤調製)		3.5g/m ² 1袋		●													

投与量\day

■プロカルバジン50m g 毎食後 d a y 2 ~ 8 奇数コースのみ	150 m g	
---	---------	--

レジメン名	(PCNSL) R-MPV療法 ◆day 3	適応		中枢神経系原発性リンパ腫													
		1クール日数		14日													
		上限クール数		5(7)クール													
使用禁忌薬剤: NSAIDs, プロトンポンプインヒビター, 利尿剤(フロセミド, チアジド系) フェニトイン, スルファメトキサゾール・トリメトプリム, ピペラシリンナトリウム テトラサイクリン, シプロフロキサシン など																	
★メソトレキセート血中濃度測定: Day4~Day5 10時 次を示す値を下回ること ⇒ 48hr値: $1 \times 10^{-6} \text{mol/L}$ ($1 \mu \text{M}$)・72hr値: $1 \times 10^{-7} \text{mol/L}$ ($0.1 \mu \text{M}$) ★測尿 および 尿 pH チェックは Day2~Day4 まで																	
【注射】		投与量\day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
《主管①》 ソルデム3A輸液【500】mL/袋 メイロン静注8.4% 20mL/管 1時~5時 点滴注射		1袋 1管			●												
《主管②》 ソルデム3A輸液【500】mL/袋 メイロン静注8.4% 20mL/管 5時~9時 点滴注射		1袋 1管			●												
《主管③》 ソルデム3A輸液【500】mL/袋 メイロン静注8.4% 20mL/管 9時~13時 点滴注射		1袋 1管			●												
<側管①> ダイアモックス注射用500mg 生理食塩液【100】mL/瓶 9時 30分かけて 点滴注射		1瓶 1瓶			●												
<側管②> デキサート注射液【6.6】mg・1mL/瓶(デカトロン) デキサート注射液【3.3】mg・1mL/管(デカトロン) 生理食塩液【50】mL/袋 15分かけて 点滴注射		1瓶 1管 1袋			●												
<側管③> 生理食塩液【50】mL/瓶 フラッシュ用 点滴注射		1管			●												
<側管④> 沐・リナート点滴静注用【25】mg瓶▼準 生理食塩液【50】mL/袋 10時 (15)分かけて 4mLで溶解し、2mL混注 主管止めて投与。前後フラッシュ 点滴注射		0.5瓶 1袋			●												
<側管⑤> 生理食塩液【50】mL/瓶 フラッシュ用 点滴注射		1管			●												

■プロカルバジン50m g 毎食後 d a y 2 ~ 8 奇数コースのみ	150 m g	
---	----------------	--

レジメン名	(PCNSL) R-MPV療法 ◆day 4~5	適応		中枢神経系原発悪性リンパ腫													
		1クール日数		14日													
		上限クール数		5(7)クール													
使用禁忌薬剤：NSAIDs, プロトンポンプインヒビター, 利尿剤(フロセミド, チアジド系) フェニトイン, スルファメトキサゾール・トリメトプリム, ピペラシリンナトリウム テトラサイクリン, シプロフロキサシン など																	
★メソトレキセート血中濃度測定: Day4~Day5 10時 次を示す値を下回ること ⇒ 48hr値: 1×10^{-6} mol/L(1μ M)・72hr値: 1×10^{-7} mol/L(0.1μ M) ★測尿 および 尿 pH チェックは Day2~Day4 まで																	
【注射】		投与量\day		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
《主管①》 ソルデム3A輸液【500】mL/袋 メイロン静注8.4% 20mL/管 1時~5時 点滴注射		1袋 1管					●	●									
<側管①> 生理食塩液【50】mL/瓶 フラッシュ用 点滴注射		1管					●	●									
<側管②> ギ*リナート点滴静注用【25】mg瓶▼準 生理食塩液【50】mL/袋 4時 (15)分かけて 4mLで溶解し、2mL混注 主管止めて投与。前後フラッシュ 点滴注射		0.5瓶 1袋					●	●									
<側管③> 生理食塩液【50】mL/瓶 フラッシュ用 点滴注射		1管					●	●									
《主管②》 ソルデム3A輸液【500】mL/袋 メイロン静注8.4% 20mL/管 5時~9時 点滴注射		1袋 1管					●	●									
《主管③》 ソルデム3A輸液【500】mL/袋 メイロン静注8.4% 20mL/管 9時~13時 点滴注射		1袋 1管					●	●									
<側管④> ダイアモックス注射用500mg 生理食塩液【100】mL/瓶 9時 30分かけて 点滴注射		1瓶 1瓶					●	●									
<側管⑤> デキサート注射液【6.6】mg・1mL/瓶(デ*カ*ト*ン) デキサート注射液【3.3】mg・1mL/管(デ*カ*ト*ン) 生理食塩液【50】mL/袋 15分かけて 点滴注射		1瓶 1管 1袋					●										

投与量\day

■プロカルバジン50m g 毎食後 d a y 2 ~ 8 奇数コースのみ	150 m g	
---	---------	--