

レジメン名	(大腸癌) CAPIRI+ベバシズマブS	適応	大腸癌
		1クール日数	21日
		上限クール数	なし

【注射】		投与量\day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
<<主管①>> 生理食塩液【100】mL/瓶 キープ用 点滴注射	1瓶	●																					
<側管①> ■ベバシズマブS点滴静注用(100/400) 生理食塩液【100】mL/瓶 90分かけて 初回の忍容性が良ければ、2回目以降は 30分で投与可能 抗癌剤点滴注射(薬剤調製)*45	7.5mg/kg 1瓶	●																					
<側管②> 生理食塩液【50】mL/袋 フラッシュ用 アバステンの後 点滴注射	1瓶	●																					
<側管③> デキサート注射液【3.3】mg・1mL/管 デキサート注射液【1.65】mg・0.5mL/管 パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg・50mL/袋 15分かけて 点滴注射	1管 1管 1袋	●																					
<側管④> 生理食塩液【50】mL/袋 フラッシュ用 イリノテカンの前 点滴注射	1瓶	●																					
<側管⑤> ■イリノテカン塩酸塩点滴静注液 (40/100) テルモ糖注5% 500mL/袋 2時間かけて 抗癌剤点滴注射(薬剤調製)閉鎖式	200mg/m2 1袋	●																					
<側管⑥> 生理食塩液【50】mL/袋 フラッシュ用 イリノテカンの後 点滴注射	1瓶	●																					

【内服】		投与量/day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
アプレピタントカプセル 125mg 1日1回 点滴の60~90分前	1錠	●																					
アプレピタントカプセル 80mg 1日1回 朝 食後	1錠	●		●	●																		

【内服】		投与量/day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
■カベシタピン錠 300mg 1日2回 朝 夕 食後	mg	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ビドキサール錠 20mg 1日3回 朝 昼 夕 食後	3錠	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

ビドキサール錠は、主治医の判断
腸/化療/≤5h

カベシタピン	
体表面積	初回基準量
~1.31m2未満	900mg/回(×2)
1.31m2以上~1.69m2未満	1,200mg/回(×2)
1.69m2以上~2.07m2未満	1,500mg/回(×2)
2.07m2以上~	1,800mg/回(×2)