

レジメン名	(全身性ALアミロイドーシス) DCyBorD療法 (1~2サイクル)	適応	アミロイドーシス
		1クール日数	28日
		上限クール数	2

【注射】

		投与量\day																																																							
		1							7							8							14							15							21							22							28						
<b>&lt;皮下注射&gt;</b>																																																									
■ダラキューロ配合皮下注15mL/瓶 3-5分かけて投与、投与後30分~60分経過観察 抗癌剤皮下注射(薬剤調製)閉鎖式	1瓶	●																																																							
<b>&lt;皮下注射&gt;</b>																																																									
■ベルケイド注(3) 生理食塩液【20】mL/管 1パイルを生食1.2mLで溶解(2.5mg/mL)とし、 必要量抜き取り使用 1分かけて 抗癌剤皮下注射(薬剤部調製)	1.3mg/m2 1管	●																																																							

血/化療/≤1h

【内服】

		投与量\day																																																							
		1							7							8							14							15							21							22							28						
エンドキサン錠50mg 1日1回 デカドロンと同時に内服	300mg/m2	●																																																							
カロナール錠200mg レスタミン錠10mg デカドロン錠4mg ダラキューロの1時間前に内服(院内処方)	2錠 3錠 10錠	●																																																							
モンテルカスト錠10mg(1サイクル目day1のみ) ダラキューロの1時間前(院内処方)	1錠	●																																																							

レジメン名	(全身性ALアミロイドーシス) DCyB or D療法 (3~6サイクル)	適応	アミロイドーシス
		1クール日数	28日
		上限クール数	4

【注射】		投与量\day		1				7	8					14	15					21	22					28	
<b>&lt;皮下注射&gt;</b>																											
■ダラキューロ配合皮下注15mL/瓶 3-5分かけて投与、投与後30分~60分経過観察 抗癌剤皮下注射(薬剤調製)閉鎖式	1瓶	●													●												
<b>&lt;皮下注射&gt;</b>																											
■ベルケイド注(3) 生理食塩液【20】mL/管 1パイルを生食1.2mLで溶解(2.5mg/mL)とし、 必要量抜き取り使用 1分かけて 抗癌剤皮下注射(薬剤部調製)	1.3mg/m2 1管	●							●						●												

血/化療/≦1h

【内服】		投与量\day		1				7	8					14	15					21	22					28	
エンドキサン錠50mg 1日1回 デカドロンと同時に内服				300mg/m2	●					●					●						●						
カロナール錠200mg レスタミン錠10mg デカドロン錠4mg ダラキューロの1時間前に内服(院内処方)				2錠 3錠 10錠	●										●												
デカドロン錠4mg ベルケイド注の前に内服(院内処方)				10錠						●												●					