

レジメン名	(乳癌) Weeklyパクリタキセル	適応	乳癌
		1クール日数	28日
		上限クール数	なし

【注射】		投与量\day	1				7	8					14	15				21	22				28
＜主管①＞ 生理食塩液【100】mL/瓶 キープ用 点滴注射	1瓶		●					●						●									
＜側管①＞ デキサート注射液【6.6】mg・2mL/管(デカドロン) ファモチジン静注 20mg・20mL/管 生理食塩液【100】mL/瓶 パクリタキセル注射液「NK」投与30分前までに 投与を終了すること。 30分かけて 点滴注射	1瓶 1管 1瓶		●					●						●									
＜側管②＞ 生理食塩液【50】mL/瓶 30分かけて 点滴注射	1瓶		●					●						●									
＜側管③＞ ■【GE】パクリタキセル注射液「NK」 (30/100) ブドウ糖液【5% 250mL】/瓶 2時間かけて(忍容性が確認できれば1時間で投与可) 抗癌剤点滴注射(薬剤調製)	80mg/m2 1瓶		●					●						●									
フィルター付輸液セット			●					●						●									
＜側管④＞ 生理食塩液【50】mL/瓶 フラッシュ用 点滴注射	1瓶		●					●						●									

【内服】		投与量\day	1				7	8					14	15				21	22				28
レスタミンコーワ錠 10mg 医師の指示通り(頓服用) 早急 パクリタキセル注射液「NK」投与60分前に内服	5錠		●					●						●									

乳/化療/≤3h