

レジメン名	(乳癌) カドサイラ (トラスツズマブエムタンシン)	適応	乳癌
		1クール日数	21日
		上限クール数	なし

【注射】		投与量\day	1						7	8							14	15							21	
《主管①》 生理食塩液【100】mL/瓶 キープ用 点滴注射	1瓶	●																								
<側管①> デキサート注射液【6.6】mg・2mL/瓶(テカドロン) デキサート注射液【3.3】mg・1mL/管(テカドロン) ラモセトロン注射液 0.3mg・2mL/管 生理食塩液【100】mL/瓶 30分かけて 点滴注射	1瓶 1管 1管 1瓶	●																								
<側管②> 生理食塩液【50】mL/瓶 フラッシュ用 点滴注射	1瓶	●																								
<側管③> ■カドサイラ注 (100/160) テルモ生食【250】mL/袋(点滴用) 初回 90分かけて、忍容性が良好であれば、 2回目以降は30分まで短縮できる 抗癌剤点滴注射(薬剤調製)	3.6mg/kg 1袋	●																								
フィルター付輸液セット		●																								
<側管④> 生理食塩液【50】mL/瓶 フラッシュ用 点滴注射	1瓶	●																								

【内服】		投与量\day	1						7	8							14	15							21	
フロベン錠 40mg セレスターナ配合錠(セレスタミン) 医師の指示通り(頓服用) 早急 カドサイラ開始30分前に内服	1錠 1錠	●																								

【内服】			1	2	3	4	5	6	7	8							14	15							21	
デカドロン錠 4mg 1日2回 朝 夕 食 後	2錠		●	●																						

乳/化療/≤2h