

レジメン名	(マントル細胞リンパ腫) Rーベンダムスチン	適応		マントル細胞リンパ腫								
		1クール日数	28日	1クール日数	28日							
		上限クール数	6クール	1クール日数	28日							
【注射】		投与量\day	1	2	3	7	8	14	15	21	22	28
《主管①》 生理食塩液【100】mL/瓶 ケモ用キープ 点滴注射		1瓶	●	●								
<側管①> ■リツキシマブBS点滴静注「KHK」 テルモ糖注5% 500mL/袋 (mL入力) 5%グルコースは1mg/mLとなるように調整 最初の30分は50mg/hr、その後30分毎に50mg/hrずつ上げて、最大400mg/hrまで。2回目以降は、初期投与時の副作用が軽微であれば、100mg/hrで開始し、30分毎に100mg/hrずつ上げて最大400mg/hr。適宜減速 抗癌剤精密持続点滴注射 (薬剤部調製)		375mg/m2 0.001	●									
<側管②> 生理食塩液【50】mL/瓶 ルートフラッシュ用 点滴注射		1瓶	●	●								
<側管③> デキサート注射液【3.3mg】mg・1mL/管 デキサート注射液【1.65mg】mg・0.5mL/管 アロキシン注射液0.75mg/管 生理食塩液【100】mL/瓶 30分かけて 点滴注射		1管 1管 1管 1瓶	●									
<側管④> 生理食塩液【50】mL/瓶 ルートフラッシュ用 点滴注射		1瓶	●	●								
<側管⑤> ■トリアキシン注(100)▼限定 注射用水【100】mL/瓶 テルモ生食【250】mL/袋(点滴用) 1時間かけて 1 ^ハ イアルあたり40mL(100mg製剤)もしくは10mL(25mg製剤)の注射用水で溶解し、必要量を生食へ希釈する。 抗癌剤精密持続点滴注射 (薬剤部調製)		90mg/m2 1瓶 1袋	●	●								
<側管⑥> 生理食塩液【50】mL/瓶 ルートフラッシュ用 点滴注射		1瓶	●									
<側管⑦> デキサート注射液【3.3mg】mg・1mL/管 デキサート注射液【1.65mg】mg・0.5mL/管 生理食塩液【100】mL/瓶 30分かけて 点滴注射		1管 1管 1瓶		●								
【内服】		投与量\day	1	2	3	7	8	14	15	21	22	28
カロナール錠【200】mg リツキシマブ開始30分前 医師の指示通り (頓服用)		2錠	●									
レスタミンコーワ錠 10mg リツキシマブ開始30分前 医師の指示通り (頓服用)		3錠	●									
アプレピタントカプセル 125mg 1日1回 点滴の60~90分前		1錠	●									
アプレピタントカプセル 80mg 1日1回 朝食後		1錠		●	●							

アシクロビル・バクタは主治医の判断で内服