

レジメン名	(大腸癌MSI-High) ニボルマブ+イピリムマブ	適応	大腸癌
		1クール日数	21日
		上限クール数	4クール

【注射】		投与量\day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
≪主管①≫																							
生理食塩液【100】mL/瓶	1 瓶	●																					
キープ用 点滴注射																							
<側管①>																							
■オプジーボ点滴静注	240mg/body	●																					
生理食塩液【50】mL/本	1 本																						
30分以上かけて投与 オプジーボ投与完了後30分以上間隔を あけてヤーボイ投与開始 抗癌剤点滴注射（薬剤調製）閉鎖式																							
フィルター付輸液セット		●																					
<側管②>																							
生理食塩液【50】mL/袋	1 袋	●																					
フラッシュ用 30分以上かけて 点滴注射																							
<側管③>																							
■ヤーボイ点滴静注	1mg/kg	●																					
生理食塩液【50】mL/瓶	0.4 瓶																						
30分かけて （※体重が25kg以上の場合） 抗癌剤点滴注射（薬剤調製）閉鎖式																							
<側管④>																							
生理食塩液【50】mL/袋	1 袋	●																					
フラッシュ用 点滴注射																							