	レジメン名 (悪性神経膠腫) ベバシズマブ 2週毎+テモゾロミド												適応					悪性神経膠腫										
レジメン名											1クール日数						28日											
											上限クール数					:	6											
【注射】		投与量∕day	1	2	3	4	5	6 7	7 8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22 2	23 2	24 2	5 26	i 27	28
≪主管①≫																			П				Т				П	
生理食塩液【100】mL/瓶		1 瓶																										
血管確保用・フラッシュ用			ľ																									
点滴注射								_	L			L	L				_	L	Ш	ш	_	4	_	_	_		ш	_
〈側管①〉		40 //																										
■アパスチン点滴静注用		10mg/kg																										
(100/400)																						Ш	П		All			
生理食塩液【100】mL/瓶		1 瓶																										
90分かけて			_																									
※初回の忍容性が良ければ2回目以降は60																												
分、3回目以降は30分で投与可能。																												
抗癌剤点滴注射(薬剤調製)																						Ш	П		All			
<側管②>									T	T		T					T		П	П		T	十	\top	T	T	П	П
生理食塩液【50】mL/瓶		1 瓶	۱.																									ı
フラッシュ、アバス	チンの後		•													•												
点滴注射																												
		脳/化療/	≦2h																									
【内服】		投与量∖day	1				5	7	7 8						14	15						21	22					28
■ テモダールカブ1	zル	150 mg/m2							Г													T	T					
		2回日以降																										

150 mg/m2 2回目以降

200mg/m2可

1日1回朝 食間