

レジメン名	(乳癌) サシツズマブ ゴビテカン	適応	乳癌
		1クール日数	21日
		上限クール数	なし

【注射】		投与量\day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
<<主管①>> 生理食塩液【100】mL/瓶 キープ用 点滴注射	1 瓶		●							●													
<側管①> パロノセトロン注0.75mg・50mL/袋 デキサート注射液【6.6】mg アロカリス点滴静注235mg 10mL/瓶 ポララミン注5mg・1mL 30分かけて 点滴注射	1 袋 1 瓶 1 瓶 1 管		●							●													
<側管②> 生理食塩液【50】mL/袋 フラッシュ用 点滴注射	1 袋		●							●													
<側管③> アセリオ静注射液1000mg・100mL/袋 15分かけて	1 袋		●							●													
<側管④> 生理食塩液【50】mL/袋 フラッシュ用 点滴注射	1 袋		●							●													
<側管⑤> ■トロデルビ点滴静注用200mg テルモ生食【250】mL/袋 初回180分かけて投与、初回投与時に忍容性が良好 だった場合は2回目以降は60分かけて投与 必要量と同量を生食から抜き取り全体で 250mL(500mL)とする。希釈量は体重で異なるため要 確認。 体重85kg以下：生食250mL、86kg以上：生食500mL 抗癌剤点滴注射（薬剤調製）	10mg/kg 1 袋		●							●													
<側管⑥> 生理食塩液【50】mL/袋 フラッシュ用 点滴注射 トロデルビ投与後30分以上は状態を観察	1 袋		●							●													