

レジメン名	(乳癌) トラスツズマブ+カペシタピンA法 3投1休	適応	乳癌
		1クール日数	28日
		上限クール数	なし

【注射】		投与量\day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
<<主管①>> 生理食塩液【100】mL/瓶 キープ用 点滴注射	1瓶		●							●							●							●						
<側管①> ■トラスツズマブBS点滴静注用「NK」 (60/150) 注射用水【20】mL/管 テルモ生食【250】mL/袋(点滴用) 初回は2時間かけて、2回目以降は1時間 (30分でも投与可能) 60mgパリアルは3.0mL、150mgパリアルは7.2mLの 注射用水で溶解 21mg/mLとなる 抗癌剤点滴注射(薬剤調製)	初回 4mg/kg 2回目以降 2mg/kg 1~2管 1袋		●							●							●							●						
<側管②> 生理食塩液【50】mL/瓶 フラッシュ用 点滴注射	1瓶		●							●							●							●						

【内服】		投与量\day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
フロベン錠 40mg セレスターナ錠 早急 医師の指示通り(頓服用) トラスツズマブ開始30分前に内服	1錠 1錠		●							●							●							●						
■カペシタピン錠 300「サワイ」 1日2回 朝 夕 食 後	mg		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ピドキサル錠 20mg 1日3回 朝 昼 夕 食 後	3錠		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

ピドキサル錠は、主治  
医の判断で必要に応じて

カペシタピン	
体表面積	1回用量
~1.31m <sup>2</sup> 未満	900mg/回(×2)
1.31m <sup>2</sup> 以上~1.64m <sup>2</sup> 未満	1,200mg/回(×2)
1.64m <sup>2</sup> 以上~	1,500mg/回(×2)

乳/化療/≤2h