

レジメン名	(胃神経内分泌腫瘍)カルボプラチン+エトポシド	適応	胃神経内分泌腫瘍
		1クール日数	21日
		上限クール数	なし

【注射】		投与量\day	1	2	3	4	5	6	7	8					14	15					21
≪主管①≫ テルモ生食【500】mL/袋(点滴用) ケモ用キープ 点滴注射		1袋	●	●	●																
<側管①> デキサート注射液【3.3】mg・1mL/管(デカトロン) デキサート注射液【1.65】mg・0.5mL/管(デカトロン) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg・50mL/袋 15分かけて 点滴注射		1管 1管 1袋	●																		
<側管①> デキサート注射液【3.3】mg・1mL/管(デカトロン) 生理食塩液【100】mL/瓶 30分かけて 点滴注射		1瓶 1瓶		●	●																
<側管②> ■カルボプラチン注 テルモ生食【500】mL/袋(点滴用) 2時間かけて 点滴注射(薬剤部調製)		AUC5 1袋	●																		
<側管③> 生理食塩液【50】mL/瓶 点滴注射 ルートフラッシュ用 カルボプラチンの後 ラステットの前		1瓶	●																		
<側管④> ■エトポシド注 テルモ生食【500】mL/袋(点滴用) 2時間かけて 点滴注射(薬剤部調製)		80mg/m2 1袋	●	●	●																
<側管⑤> 生理食塩液【50】mL/瓶 点滴注射 ルートフラッシュ用 ラステットの後		1瓶	●	●	●																

胃/化療/≤5h

【内服】		1	2	3	4	5	6	7	8					14	15					21
アプレピタントカプセル 125mg 1日1回 点滴の60～90分前		1C	●																	
アプレピタントカプセル 80mg 1日1回 朝 食後		1C		●	●															