

レジメン名	(クローン病) リサンキズマブ1200mg投与	適応	クローン病
		1クール日数	56
		上限クール数	なし

投与後は皮下注射による投与を継続し、1200mg再投与は16週間以上間隔を空けること。

【注射】		投与量\day	1		7	8		14	15		21	22		28
《主管①》	ブドウ糖液【5% 100mL】/瓶	1 瓶	●											
	ルートキープ用													
	点滴注射													
<側管①>	■スキリージ点滴静注	1200mg/body	●											
	ブドウ糖液【5% 250mL】/袋	1 袋												
	2時間以上かけて													
	点滴注射（薬剤調製）													
<側管②>	ブドウ糖液【5% 50mL】/瓶	1 瓶	●											
	ルートフラッシュ用													
	点滴注射													
フィルター付輸液セット			●											

【注射】		投与量\day	29		35	36		42	43		49	50		56
《主管①》	ブドウ糖液【5% 100mL】/瓶	1 瓶												
	ルートキープ用													
	点滴注射													
<側管①>	■スキリージ点滴静注	1200mg/body												
	ブドウ糖液【5% 250mL】/袋	1 袋												
	2時間以上かけて													
	点滴注射（薬剤調製）													
<側管②>	ブドウ糖液【5% 50mL】/瓶	1 瓶												
	ルートフラッシュ用													
	点滴注射													
フィルター付輸液セット														

クローン病/化療/≤3h