

| | | | |
|-------|---------------------------|--------|-----|
| レジメン名 | (大腸癌) ペバシズマブBS+mFOLFOX6 ◆ | 適応 | 大腸癌 |
| | | 1クール日数 | 14日 |
| | | 上限クール数 | なし |

一次治療（術後補助療法を除く）：……………5mg/kg
 二次治療/前治療からの変更理由：増悪以外（副作用、患者希望）……………5mg/kg
 二次治療/前治療からの変更理由：増悪による変更……………10mg/kg

| 【注射】 | | 投与量\day | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|
| ＜主管①＞ | 生理食塩液【100】mL/瓶 キープ用 中心静脈注射 | 1 瓶 | ● | | | | | | | | | | | | | |
| ＜側管①＞ | ■ペバシズマブBS点滴静注用 (100/400) 生理食塩液【100】mL/瓶 90分かけて 抗癌剤中心静脈注射（薬剤調製） | mg/kg 1 瓶 | ● | | | | | | | | | | | | | |
| ＜側管②＞ | 生理食塩液【50】mL/袋 フラッシュ用 | 1 瓶 | ● | | | | | | | | | | | | | |
| ＜側管③＞ | デキサート注射液【3.3】mg・1mL/管 デキサート注射液【6.6】mg・2mL/瓶 グラニセトロン静注液 3mg・3mL/管 生理食塩液【100】mL/瓶 30分かけて 中心静脈注射 | 1 管 1 瓶 1 管 1 瓶 | ● | | | | | | | | | | | | | |
| ＜側管④＞ | ■オキサリプラチン注 (50/100) 大塚糖液【5% 250mL】/袋 2時間かけて 抗癌剤中心静脈注射（薬剤調製） | 85mg/m ² 1 瓶 | ● | | | | | | | | | | | | | |
| ＜側管⑤＞ | 生理食塩液【50】mL/袋 フラッシュ用 | 1 瓶 | ● | | | | | | | | | | | | | |
| ＜主管②＞ | ■レボホリナート点滴静注用 大塚糖液【5% 250mL】/袋 2時間かけて 主管①と付け替え、側管④と同時に開始 中心静脈注射（薬剤調製） | 200mg/m ² 1 瓶 | ● | | | | | | | | | | | | | |
| ＜側管⑥＞ | ■フルオロウラシル注 (5-FU) 主管②側管④終了後 抗癌剤中心静脈注射（薬剤調製） | 400mg/m ² | ● | | | | | | | | | | | | | |
| ＜側管⑦＞ | ■フルオロウラシル注 (5-FU) 生理食塩液【50】mL (mL入力) 46時間かけて インフューザー使用 抗癌剤局所持続注入 (薬剤調製) | 2400mg/m ² 24 mL | ●● | | | | | | | | | | | | | |
| | 生理食塩液【20】mL/管 血管確保用 | 1 管 | ● | | | | | | | | | | | | | |
| | パリンロック用シリンジ 500単位・5mL/筒 フラッシュ用 中心静脈注射 | 1 筒 | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 【内服】 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | デカドロン錠 4mg 1日2回 朝 夕 食 後 | 2 錠 | | ● | ● | | | | | | | | | | | |

腸/化療/≤5h