

レジメン名	(膀胱癌) FOLFOX	適応		膀胱癌
		1クール日数		14日
		上限クール数		なし

【注射】		投与量\day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<<主①>> 生理食塩液【100】mL/瓶 キープ用 中心静脈注射		1 瓶	●													
<側管①> デキサート注射液【6.6】mg・2mL/瓶(デカトロン) グラニセトロン点滴《ハック》【3mg】・50mL/袋 15分かけて 中心静脈注射		1 瓶 1 袋	●													
<側管②> ■オキサリプラチン注(50/100) デキサート注射液【3.3】mg・1mL/管(デカトロン) ブドウ糖液【5% 250mL】/袋 2時間かけて 抗癌剤中心静脈注射(薬剤調製)		85mg/m ² 1 管 1 袋	●													
<<側管③>> 生理食塩液【50】mL/袋 フラッシュ用 中心静脈注射		1 袋	●													
<主②> ■レボホリナート点滴静注用 ブドウ糖液【5% 250mL】/袋 2時間かけて 側管②と同時に 中心静脈注射(薬剤部調製)		200mg/m ² 1 袋	●													
<側管④> ■フルオロウラシル注(5-FU) ②③終了後 抗癌剤中心静脈注射(薬剤調製)		400mg/m ²	●													
<側管⑤> ■フルオロウラシル注(5-FU) 生理食塩液【20】mL(mL入力) 46時間かけて インフューザー使用 抗癌剤局所持続注入(薬剤調製)		2400mg/m ² 20 mL	●●													
生理食塩液【20】mL/管 血管確保用 中心静脈注射		1 管	●													
ハック用 500単位・5mL/筒 フラッシュ用 中心静脈注射		1 筒	●													
【内服】			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
デカドロン錠 4mg 1日2回 朝 夕 食 後		2 錠		●	●											

膀胱/化療/≤3h