

レジメン名 (マントル細胞リンパ腫) VcR-CAP	適応								マントル細胞リンパ腫													
	1クール日数				21日																	
	上限クール数				6																	
【注射】	投与量\day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
【主管①】 生理食塩液【100】mL/瓶 ケモ用キープ 点滴注射	1瓶	●																				
＜側管①＞ 水溶性ブレドニン50mg 生理食塩液【50】mL/瓶 10分かけて 点滴注射	2管 1瓶	●																				
＜側管②＞ 生理食塩液【50】mL/瓶 ルートフラッシュ用 点滴注射	1瓶	●																				
＜側管③＞ ■リツキシマブBS点滴静注「KHK」 テルモ糖注5% 500mL/袋 (mL入力) 5%グルコースは1mg/mLとなるように調製 最初の30分は50mg/hr、その後30分毎に 50mg/hrずつ上げて最大400mg/hrまで。 2回目以降は、初期投与時の副作用が軽微 であれば100mg/hrで開始し、30分毎に 100mg/hrずつ上げて最大400mg/hr。適宜減速 抗癌剤点滴注射（薬剤調製）	375mg/m2 0.001 mL	●																				
＜側管④＞ 生理食塩液【50】mL/瓶 ルートフラッシュ用 点滴注射	1瓶	●																				
＜側管⑤＞ アロキシ静注0.75mg・5mL/瓶 生理食塩液【50】mL/瓶 10分かけて 点滴注射	1瓶 1瓶	●																				
＜側管⑥＞ ■アドリアシン注(10)▼限定 生理食塩液【100】mL/瓶 30分かけて 抗癌剤点滴注射（薬剤調製）	50mg/m2 1瓶	●																				
＜側管⑦＞ 生理食塩液【50】mL/瓶 ルートフラッシュ用 アドリアシンの後 エンドキサンの前 点滴注射	1瓶	●																				
＜側管⑧＞ ■エンドキサン注(100/500) テルモ生食【500】mL/袋(点滴用) 90分かけて 抗癌剤点滴注射（薬剤調製）*閉鎖式	750mg/m2 1袋	●																				
＜側管⑨＞ 生理食塩液【50】mL/瓶 ルートフラッシュ用 エンドキサンの後 点滴注射	1瓶	●																				
＜皮下注射＞ ■ベルケイド注(3) 生理食塩液【20】mL/管 1分かけて 1ℓイ7ℓを生食1.2mLで溶解(2.5mg/mL)とし、 必要量抜き取り使用 抗癌剤皮下注射（薬剤部調製）	1.3mg/m2 1管	●		●					●					●								
【内服】	投与量\day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
カロチール錠【200】mg リツキサン開始30分前 医師の指示通り（頓服用）	2錠	●																				
レスタミンコーワ錠 10mg リツキサン開始30分前 医師の指示通り（頓服用）	3錠	●																				
ブレドニゾン錠【5】mg 1日2回 朝 夕 食後	20錠		●	●	●																	
ゾピラックス錠【200】mg 1日1回 夕 食後	1錠	●																				
アロプリノール錠 100mg 1日3回 朝 昼 夕 食後	3錠	●	●	●																		
ラベプラゾールNa錠 10mg 1日1回 夕 食後	1錠	●																				

ゾピラックス錠は主治医の判断

アロプリノール錠・ラベプラゾール錠は主治医の判断