

レジメン名	(乳癌)トラスツズマブ+ドセタキセル	適応	乳癌
		1クール日数	21日
		上限クール数	なし

【注射】		投与量\day	1	7	8	14	15	21
<<主管①>> 生理食塩液【100】mL/瓶 キープ用 点滴注射	1 瓶		●		●		●	
<側管①> デキサート注射液【6.6】mg・2mL/瓶(テカドロン) 生理食塩液【100】mL/瓶 30分かけて 点滴注射	1 瓶 1 瓶		●					
<側管②(day1)><側管①(day8, 15)> ■トラスツズマブBS点滴静注 (60/150)  注射用水【20】mL/管 テルモ生食【250】mL/袋(点滴用) 初回は2時間かけて 2回目以降は1時間 (30分でも投与可能) 60mg <sup>ハ</sup> イアルは3.0mL、150mg <sup>ハ</sup> イアルは7.2mLの注 射用水で溶解 21mg/mLとなる 抗癌剤点滴注射(薬剤調製)	初回 4mg/kg 2回目以降 2mg/kg 1~2管 1袋		●		●		●	
<側管③(day1)><側管②(day8, 15)> 生理食塩液【50】mL/瓶 フラッシュ用 点滴注射	1 瓶		●		●		●	
<側管④> ■ドセタキセル注 (20/80) テルモ糖注5% 500mL/袋 2時間かけて 抗癌剤点滴注射(薬剤調製)	70mg/m <sup>2</sup>  1 袋		●					
<側管⑤> 生理食塩液【50】mL/瓶 フラッシュ用 点滴注射	1 瓶		●					

【内服】		投与量\day	1	7	8	14	15	21
フロベン錠 40mg セレスターナ錠 医師の指示通り(頓服用) 早急 トラスツズマブ開始30分前に内服	1 錠 1 錠		●		●		●	

乳/化療/≤4h 乳/化療/≤2h 乳/化療/≤2h