

レジメン名	(大腸癌) イリノテカンA法	適応	大腸癌
		1クール日数	28日
		上限クール数	なし

【注射】		投与量\day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
<<主管①>> 生理食塩液【100】mL/瓶 キープ用 点滴注射	1瓶		●							●							●													
<側管①> デキサート注射液【3.3】mg・1mL/管 デキサート注射液【1.65】mg・0.5mL/管 アロキシ静注 0.75mg・5mL/瓶 生理食塩液【100】mL/瓶 30分かけて 点滴注射	1管 1管 1管 1瓶		●							●							●													
<側管②> 生理食塩液【50】mL/瓶 フラッシュ用 点滴注射	1瓶		●							●							●													
<側管③> ■イリノテカン塩酸塩点滴静注液「タイレ」 (40/100) テルモ糖注5% 500mL/袋 2時間かけて 抗癌剤点滴注射(薬剤調製)	100mg/m ² 1袋		●							●							●													
<側管④> 生理食塩液【50】mL/瓶 フラッシュ用 点滴注射	1瓶		●							●							●													

腸/化療/≤3h

【内服】		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
アプレピタントカプセル125mg 1日1回 点滴の60~90分前	1C	●							●							●													
アプレピタントカプセル 80mg 1日1回 朝食後	1C		●	●						●	●						●	●											