

レジメン名	(潰瘍性大腸炎) リサンキズマブ1200mg投与	適応	潰瘍性大腸炎
		1クール日数	56
		上限クール数	なし

投与後は皮下注射による投与を継続し、1200mg再投与は16週間以上間隔を空けること。

【注射】		投与量\day	1	7	8	14	15	21	22	28
《主管①》	ブドウ糖液【5% 100mL】/瓶 ルートキープ用 点滴注射	1瓶	●							
<側管①>	■スキリージ点滴静注 ブドウ糖液【5% 250mL】/袋 2時間以上かけて 点滴注射（薬剤調製）	1200mg/body 1袋	●							
<側管②>	ブドウ糖液【5% 50mL】/瓶 ルートフラッシュ用 点滴注射	1瓶	●							
フィルター付輸液セット			●							

【注射】		投与量\day	29	35	36	42	43	49	50	56
《主管①》	ブドウ糖液【5% 100mL】/瓶 ルートキープ用 点滴注射	1瓶								
<側管①>	■スキリージ点滴静注 ブドウ糖液【5% 250mL】/袋 2時間以上かけて 点滴注射（薬剤調製）	1200mg/body 1袋								
<側管②>	ブドウ糖液【5% 50mL】/瓶 ルートフラッシュ用 点滴注射	1瓶								
フィルター付輸液セット										

潰瘍性大腸炎/化療/≤3h