

レジメン名	(難治性ネフローゼ症候群) リツキサン(先発) (計5投)	適応	難治性ネフローゼ症候群
		1クール日数	6か月
		上限クール数	5クール

【注射】		投与量\day	1	7	8	14	15	21	22	28
《主管①》	生理食塩液【100】mL/瓶 ケモ用キープ 点滴注射	1 瓶	●							
<側管①>	■リツキサン注 テルモ生食 500mL/袋 (mL入力) 1mg/mLとなるように調整 最初の30分は50mg/hr、その後30分毎に50mg/hrずつ上げて、最大400mg/hrまで。2回目以降は、初期投与時の副作用が軽微であれば、100mg/hrで開始し、30分毎に100mg/hrずつ上げて最大400mg/hr。適宜減速 抗癌剤精密持続点滴注射 (薬剤部調製)	500mg/body 450mL	●							
<側管②>	生理食塩液【50】mL/瓶 ルートフラッシュ用 点滴注射	1 瓶	●							

【内服】		投与量\day	1	7	8	14	15	21	22	28
カロナール錠【200】mg リツキサン開始30分前 医師の指示通り (頓服用)	2 錠	●								
レスタミンコーワ錠 10mg リツキサン開始30分前 医師の指示通り (頓服用)	3 錠	●								

内/化療/≤5h

【注射】		投与量\day	29	183 (6か月ごと)
《主管①》	生理食塩液【100】mL/瓶 ケモ用キープ 点滴注射	1 瓶		
<側管①>	■リツキサン注 テルモ生食 500mL/袋 (mL入力) 5%グルコースは1mg/mLとなるように調整 最初の30分は50mg/hr、その後30分毎に50mg/hrずつ上げて、最大400mg/hrまで。2回目以降は、初期投与時の副作用が軽微であれば、100mg/hrで開始し、30分毎に100mg/hrずつ上げて最大400mg/hr。適宜減速 抗癌剤精密持続点滴注射 (薬剤部調製)	500mg/body 450mL		
<側管②>	生理食塩液【50】mL/瓶 ルートフラッシュ用 点滴注射	1 瓶		

【内服】		投与量\day	29	182 (6か月ごと)
カロナール錠【200】mg リツキサン開始30分前 医師の指示通り (頓服用)	2 錠			
レスタミンコーワ錠 10mg リツキサン開始30分前 医師の指示通り (頓服用)	3 錠			

※薬剤費 (1クールあたり) / 体表面積1.5m²

■リツキサン点滴静注 500mg 1 瓶 ¥132,999

¥132,999

2021 リツキサン点滴静注 100mg ¥27,215
リツキサン点滴静注 500mg ¥132,999