

レジメン名	(潰瘍性大腸炎) ベドリズマブ2クール目以降8週毎	適応	潰瘍性大腸炎
		1クール日数	56日
		上限クール数	なし

【注射】		投与量\day		1	7	8	14	15	21	22	28
《主管①》	生理食塩液【100】mL/瓶 ルートキープ用 点滴注射	1瓶		●							
<側管①>	■エンタイビオ点滴注射用 注射用水【20】mL 生理食塩液【100】mL/瓶 インタビオ1瓶あたり4.8mLの注射用水 で溶解、生食100mLで希釈して投与 30分以上かけて 点滴注射（薬剤調製）	300mg/body 4.8 mL 1瓶		●							
<側管②>	生理食塩液【50】mL/瓶 ルートフラッシュ用 点滴注射	1瓶		●							

【注射】		投与量\day		29	35	36	42	43	49	50	56
《主管①》	生理食塩液【100】mL/瓶 ルートキープ用 点滴注射	1瓶									
<側管①>	■エンタイビオ点滴注射用 注射用水【20】mL 生理食塩液【100】mL/瓶 インタビオ1瓶あたり4.8mLの注射用水 で溶解、生食100mLで希釈して投与 30分以上かけて 点滴注射（薬剤調製）	300mg/body 4.8 mL 1瓶									
<側管②>	生理食塩液【50】mL/瓶 ルートフラッシュ用 点滴注射	1瓶									

潰瘍性大腸炎/化療/≤1h