

レジメン名	(潰瘍性大腸炎) リサンキズマブ初回導入										適応		潰瘍性大腸炎																									
											1クール日数		84																									
											上限クール数		1																									
【注射】												投与量\day																										
《主管①》 ブドウ糖液【5% 100mL】/瓶 ルートキープ用 点滴注射			1 瓶			1				7				8				14				15				21				22				28				
<側管①> ■スキリージ点滴静注 ブドウ糖液【5% 250mL】/袋 2時間以上かけて 点滴注射（薬剤調製）			1200mg/body 1 袋																																			
<側管②> ブドウ糖液【5% 50mL】/瓶 ルートフラッシュ用 点滴注射			1 瓶																																			
フィルター付輸液セット																																						
【注射】												投与量\day																										
《主管①》 ブドウ糖液【5% 100mL】/瓶 ルートキープ用 点滴注射			1 瓶			29					35				36					42				43					49				50				56	
<側管①> ■スキリージ点滴静注 ブドウ糖液【5% 250mL】/袋 2時間以上かけて 点滴注射（薬剤調製）			1200mg/body 1 袋																																			
<側管②> ブドウ糖液【5% 50mL】/瓶 ルートフラッシュ用 点滴注射			1 瓶																																			
フィルター付輸液セット																																						
【注射】												投与量\day																										
《主管①》 ブドウ糖液【5% 100mL】/瓶 ルートキープ用 点滴注射			1 瓶			57						63				64					70				71					77				78				84
<側管①> ■スキリージ点滴静注 ブドウ糖液【5% 250mL】/袋 2時間以上かけて 点滴注射（薬剤調製）			1200mg/body 1 袋																																			
<側管②> ブドウ糖液【5% 50mL】/瓶 ルートフラッシュ用 点滴注射			1 瓶																																			
フィルター付輸液セット																																						

潰瘍性大腸炎/化療/≤3h