

レジメン名	(乳癌) ddPTX	適応		乳癌
		1クール日数		14日
		上限クール数		4

【注射】		投与量\day	1	3	7	8	14
＜主管①＞ 生理食塩液【100】mL/瓶 キープ用 点滴注射	1 瓶	●					
＜側管①＞ デキサート注射液【6.6】mg・2mL/管(デカトロン) ファモチジン静注 20mg・20mL/管 生理食塩液【50】mL/袋 パクリタキセル注射液「NK」投与30分前までに 投与を終了すること。 15分かけて 点滴注射	1 瓶 1 管 1 瓶袋	●					
＜側管②＞ 生理食塩液【50】mL/袋 30分かけて 点滴注射	1 袋	●					
＜側管③＞ ■【GE】パクリタキセル注射液「NK」 (30/100) テルモ糖注【5% 500mL】/袋 3時間かけて 抗癌剤点滴注射（薬剤調製）	175mg/m2 1 袋	●					
フィルター付輸液セット		●					
＜側管④＞ 生理食塩液【50】mL/袋 フラッシュ用 点滴注射	1 袋	●					

【内服】		投与量\day	1	3	7	8	14
レスタミンコーワ錠 10mg 医師の指示通り（頓服用） 早急 パクリタキセル注射液「NK」投与60分前に内服	5 錠	●					

【注射】		投与量\day	1	2	3	7	8	14
ペグフィルグラスチムBS皮下注3.6mg/筒 皮下注	1 筒							

ペグフィルグラスチムは
day2～3のいずれかに
プロトコル外で医師が入力

乳/化療/≤4h