

レジメン名 (イメド・アキシ)	(膀胱) オニバイド+5-FU/1-LV	適応	膀胱
		1クール日数	14日
		上限クール数	なし

【注射】		投与量\day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<<主管①>> 生理食塩液【100】mL/瓶 キープ用 中心静脈注射		1 瓶	●													
<側管①> デキサート注射液【3.3】mg・1mL/管 デキサート注射液【1.65】mg・0.5mL/管 パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg・50mL/袋 15分かけて 中心静脈注射		1 管 1 管 1 瓶	●													
<側管②> 生理食塩液【50】mL/瓶 フラッシュ用 中心静脈注射		1 瓶	●													
<側管③> ■オニバイド点滴静注 ブドウ糖液【5% 500mL】/瓶 90分かけて 抗癌剤中心静脈注射（薬剤調製） 注意：投与時インラインフィルターを 使用しないこと		70mg/m ² 1 瓶	●													
<側管④> 生理食塩液【50】mL/瓶 フラッシュ用 中心静脈注射		1 瓶	●													
<<側管⑤>> ■レボホリナート点滴静注用 (25/100) ブドウ糖液【5% 250mL】/瓶 2時間かけて 中心静脈注射（薬剤部調製）		200mg/m ² 1 瓶	●													
<側管⑥> ■フルオロウラシル注（5-FU） 生理食塩液【20】mL 46時間かけて インフューザー使用 抗癌剤局所持続注入（薬剤部調製）		2400mg/m ² 20 mL	●●													
生理食塩液【20】mL/管 血管確保用 中心静脈注射		1 管	●													
ヘミロック® リンロック用 500単位・5mL/筒 フラッシュ用 中心静脈注射		1 筒	●													
【内服】			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
アプレピタントカプセル 125mg 1日1回 点滴の60～90分前		1 錠	●													
アプレピタントカプセル 80mg 1日1回 朝食後		1 錠		●	●											

膀胱/化療/≦5h