

レジメン名	(潰瘍性大腸炎) ベドリズマブ初回導入	適応	潰瘍性大腸炎
		1クール日数	98日
		上限クール数	1

【注射】		投与量/day	1	7	8		14	15		21	22		28
《主管①》													
生理食塩液【100】mL/瓶 ルートキープ用 点滴注射	1 瓶		●						●				
〈側管①〉													
■エンタイビオ点滴注射用 注射用水【20】mL 生理食塩液【100】mL/瓶 エンタ化®1瓶あたり4.8mLの注射用水 で溶解、生食100mLで希釈して投与 30分以上かけて 点滴注射（薬剤調製）	300mg/body 4.8 mL 1 瓶								●				
〈側管②〉													
生理食塩液【50】mL/瓶 ルートフラッシュ用 点滴注射	1 瓶		●						●				

【注射】		投与量/day	29	35	36		42	43		49	50		56	57		63
《主管①》																
生理食塩液【100】mL/瓶 ルートキープ用 点滴注射	1 瓶								●							
〈側管①〉																
■エンタイビオ点滴注射用 注射用水【20】mL 生理食塩液【100】mL/瓶 エンタ化®1瓶あたり4.8mLの注射用水 で溶解、生食100mLで希釈して投与 30分以上かけて 点滴注射（薬剤調製）	300mg/body 4.8 mL 1 瓶								●							
〈側管②〉																
生理食塩液【50】mL/瓶 ルートフラッシュ用 点滴注射	1 瓶								●							

【注射】		投与量/day	64	70	71		77	78		84	85		91	92		98
《主管①》																
生理食塩液【100】mL/瓶 ルートキープ用 点滴注射	1 瓶															
〈側管①〉																
■エンタイビオ点滴注射用 注射用水【20】mL 生理食塩液【100】mL/瓶 エンタ化®1瓶あたり4.8mLの注射用水 で溶解、生食100mLで希釈して投与 30分以上かけて 点滴注射（薬剤調製）	300mg/body 4.8 mL 1 瓶															
〈側管②〉																
生理食塩液【50】mL/瓶 ルートフラッシュ用 点滴注射	1 瓶															

潰瘍性大腸炎/化療/≤1h