

レジメン名	(大腸癌) ペバシズマブBS+トリフルリジン・チピラシル	適応	大腸癌
		1クール日数	28日
		上限クール数	なし

【注射】		投与量/day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
<主管①> 生理食塩液【100】mL/瓶 血管確保用・フラッシュ用 点滴注射	1瓶		●															●												
<側管①> ■ペバシズマブBS点滴静注用 (100/400) 生理食塩液【100】mL/瓶 90分かけて ※初回の忍容性が良ければ2回目以降は60分、3回目以降は30分で投与可能。 抗癌剤点滴注射(薬剤調製)	5mg/kg 1瓶		●															●												
<側管②> 生理食塩液【50】mL/瓶 フラッシュ、ペバシズマブの後 点滴注射	1瓶		●															●												

【内服】		腸/化療/≤2h	投与量/day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
■ロンサーフ配合錠 1日2回 朝・夕食後	mg/m <sup>2</sup> /day			●	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→

薬剤費 (1クールあたり)
¥117,610
¥134,768
¥150,678
¥167,836
¥184,994
¥200,904
¥202,152
¥218,062
¥235,220
¥251,130
¥252,378

ロンサーフ配合錠		初回基準量
体表面積(m <sup>2</sup> )	1.07未満	35mg/回(70mg/日) ■15mg:1錠+20mg:1錠
	1.07以上~1.23未満	40mg/回(80mg/日) ■15mg:0錠+20mg:2錠
	1.23以上~1.38未満	45mg/回(90mg/日) ■15mg:3錠+20mg:0錠
	1.38以上~1.53未満	50mg/回(100mg/日) ■15mg:2錠+20mg:1錠
	1.53以上~1.69未満	55mg/回(110mg/日) ■15mg:1錠+20mg:2錠
	1.69以上~1.84未満	60mg/回(120mg/日) ■15mg:4錠+20mg:0錠
	1.84以上~1.99未満	65mg/回(130mg/日) ■15mg:3錠+20mg:1錠
	1.99以上~2.15未満	70mg/回(140mg/日) ■15mg:2錠+20mg:2錠
	2.15以上	75mg/回(150mg/日) ■15mg:5錠+20mg:0錠
		■15mg:1錠+20mg:3錠