

レジメン名	(慢性リンパ性白血病) R-ベンダムスチン液	適応	慢性リンパ性白血病
		1クール日数	28日
		上限クール数	6クール

【注射】		投与量\day	1	2	3	7	8	14	15	21	22	28
《主管①》 生理食塩液【100】mL/瓶 ケモ用キープ 点滴注射	1瓶		●	●								
<側管①> デキサート注射液【3.3mg】mg・1mL/管 デキサート注射液【1.65mg】mg・0.5mL/管 パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg・50mL/袋 15分かけて 点滴注射	1管 1管 1袋		●									
<側管②> 生理食塩液【50】mL/瓶 ルートフラッシュ用 点滴注射	1瓶		●	●								
<側管③> <b>■リツキシマブBS点滴静注(100/500)</b>  テルモ生食500mL/袋 (mL入力) 又は生理食塩液パック「F7」【1】L (mL入力) <b>生食は1mg/mLとなるように調整</b> 最初の30分は50mg/hr、その後30分毎に50mg/hrずつ上げて、最大400mg/hrまで。2回目以降は、初期投与時の副作用が軽微であれば、100mg/hrで開始し、30分毎に100mg/hrずつ上げて最大400mg/hr。適宜減速  抗癌剤精密持続点滴注射 (薬剤部調製)	初回 375mg/m <sup>2</sup> 2回目以降 500mg/m <sup>2</sup> ----- 0.001		●									
<側管④> 生理食塩液【50】mL/瓶 ルートフラッシュ用 点滴注射	1瓶		●	●								
<側管⑤> <b>■トレアキシン点滴静注液(100)</b> テルモ生食【250】mL/袋(点滴用) 1時間かけて  抗癌剤精密持続点滴注射 (薬剤部調製)	90mg/m <sup>2</sup> 1袋		●	●								
<側管⑥> 生理食塩液【50】mL/瓶 ルートフラッシュ用 点滴注射	1瓶		●									
<側管⑦> デキサート注射液【3.3mg】mg・1mL/管 デキサート注射液【1.65mg】mg・0.5mL/管 生理食塩液【100】mL/瓶 30分かけて 点滴注射	1管 1管 1瓶			●								

【内服】		投与量\day	1	2	3	7	8	14	15	21	22	28
カロナー錠【200】mg リツキシマブ開始30分前 医師の指示通り (頓服用)	2錠		●									
レスタミンコーワ錠 10mg リツキシマブ開始30分前 医師の指示通り (頓服用)	3錠		●									
アプレピタントカプセル 125mg 1日1回 点滴の60~90分前	1錠		●									
アプレピタントカプセル 80mg 1日1回 朝食後	1錠			●	●							

アシクロビル・バクタは主治医の判断で内服