

レジメン名	(乳癌) カルボプラチン+ゲムシタビン	適応	乳癌
		1クール日数	21日
		上限クール数	なし

【注射】		投与量\day	1	2	3	4	5	6	7	8					14	15					21	
《主管①》																						
生理食塩液【100】mL/瓶 ケモ用キープ 点滴注射	1袋		●							●												
<側管> デキサート注射液【3.3】mg・1mL/管 デキサート注射液【1.65】mg・0.5mL/管 アロキシ静注 0.75mg・5mL/瓶 生理食塩液【100】mL/袋 30分かけて 点滴注射	1管 1管 1瓶 1袋		●							●												
<側管> ■カルボプラチン注「NK」 (50/150/450) テルモ生食【500】mL/袋(点滴用) 1時間かけて 抗癌剤点滴注射(薬剤調製)	AUC2 1袋		●							●												
<側管> 生理食塩液【50】mL/瓶 カルボプラチンの後 ゲムシタビンの前 点滴注射	1瓶		●							●												
<側管> ■ゲムシタビン注(200/1000) 「ヤルト」 ブドウ糖液【5%100mL】/瓶 30分かけて 抗癌剤点滴注射(薬剤調製)	1000mg/m2 1瓶		●							●												
<側管> 生理食塩液【50】mL/瓶 ルートフラッシュ用 ゲムシタビンの後 点滴注射	1瓶		●							●												

【内服】		投与量\day	1	2	3	4	5	6	7	8					14	15					21	
アプレピタントカプセル 125mg 1日1回 点滴の60~90分前	1錠		●							●												
アプレピタントカプセル 80mg 1日1回 朝食後	1錠			●	●						●	●										

乳/化療/≦3h

乳/化療/≦3h