

レジメン名	(悪性骨軟部腫瘍) ドキシソルピシン+イホスファミド【A I】	適応	悪性骨・軟部腫瘍
		1クール日数	21日
		上限クール数	なし

【注射】		投与量\day	1	2	3	4	5	6	7	8	14	15	21
《主管①》													
テルモ生食【500】mL/袋(点滴用) ケモ用キープ 点滴注射	1袋		●	●	●	●	●						
<側管> アロキシ静注 0.75mg・5mL/瓶 デキサート注射液【6.6】mg・1mL/瓶(テ'カ'ロ) デキサート注射液【3.3】mg・1mL/管(テ'カ'ロ) 生理食塩液【100】mL/瓶 30分かけて 点滴注射	1瓶 1瓶 1管 1瓶		●										
<側管> デキサート注射液【6.6】mg・1mL/瓶(テ'カ'ロ) デキサート注射液【3.3】mg・1mL/管(テ'カ'ロ) 生理食塩液【100】mL/瓶 30分かけて 点滴注射	1瓶 1管 1瓶			●	●	●	●						
<側管> ■アドリアシン注(10) テルモ生食【500】mL/袋(点滴用) 2時間かけて 抗癌剤点滴注射(薬剤調製)	30mg/m2 1袋		●	●									
<側管> 生理食塩液【50】mL/瓶 ルートフラッシュ用 点滴注射	1瓶		●	●									
<側管> ■イホマイド注(1000) ■ウロミテキサ注(100/400) テルモ生食【500】mL/袋(点滴用) 4時間かけて 抗癌剤点滴注射(薬剤調製)	2g/m2 400mg/m2 1袋		●	●	●	●	●						
<側管> YDソリタT3 500mL ■ウロミテキサ注(100/400) 2時間かけて 点滴注射	1瓶 400mg/m2		●	●	●	●	●						
<側管> YDソリタT3 500mL 2時間かけて 点滴注射	1瓶		●	●	●	●	●						
<側管> YDソリタT3 500mL ■ウロミテキサ注(100/400) 2時間かけて 点滴注射	1瓶 400mg/m2		●	●	●	●	●						
<側管> YDソリタT3 500mL 2時間かけて 点滴注射	1瓶		●	●	●	●	●						

【内服】		1	2	3	4	5	6	7	8	14	15	21
アプレピタントカプセル 125mg 1日1回 点滴の60~90分前	1C	●										
アプレピタントカプセル 80mg 1日1回 朝食後	1C		●	●								

肺/化療/10h≦