

レジメン名	(大腸癌) ベバシズマブ+トリフルリジン・チピラシル	適応	大腸癌
		1クール日数	28日
		上限クール数	なし

【注射】		投与量/day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
<主管①> 生理食塩液【100】mL/瓶 血管確保用・フラッシュ用 点滴注射	1瓶		●															●												
<側管①> ■アバステン点滴静注用 (100/400) 生理食塩液【100】mL/瓶 90分かけて ※初回の忍容性が良ければ2回目以降は60分、3回目以降は30分で投与可能。 抗癌剤点滴注射(薬剤調製)	5mg/kg 1瓶		●															●												
<側管②> 生理食塩液【50】mL/瓶 フラッシュ、アバステンの後 点滴注射	1瓶		●															●												

【内服】		腸/化療/≤2h	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
■ロンサーフ配合錠 1日2回 朝・夕食後	mg/m ² /day		●	→	→	→	→	→	→	●	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→

薬剤費 (1クールあたり)
¥117,878
¥135,080
¥151,014
¥168,216
¥185,418
¥201,352
¥202,620
¥218,554
¥235,756
¥251,690
¥252,958

ロンサーフ配合錠	
体表面积(m ²)	初回基準量
1.07未満	35mg/回(70mg/日) ■15mg:1錠+20mg:1錠
1.07以上~1.23未満	40mg/回(80mg/日) ■15mg:0錠+20mg:2錠
1.23以上~1.38未満	45mg/回(90mg/日) ■15mg:3錠+20mg:0錠
1.38以上~1.53未満	50mg/回(100mg/日) ■15mg:2錠+20mg:1錠
1.53以上~1.69未満	55mg/回(110mg/日) ■15mg:1錠+20mg:2錠
1.69以上~1.84未満	60mg/回(120mg/日) ■15mg:4錠+20mg:0錠
1.84以上~1.99未満	65mg/回(130mg/日) ■15mg:3錠+20mg:1錠
1.99以上~2.15未満	70mg/回(140mg/日) ■15mg:2錠+20mg:2錠
2.15以上	75mg/回(150mg/日) ■15mg:5錠+20mg:0錠 ■15mg:1錠+20mg:3錠