

手術前後の分子標的薬中止期間一覧

注射薬（一般名 五十音順）

薬効	一般名	商品名	術前休薬の目安	術後再開の目安	参考文献	備考
抗悪性腫瘍剤	アフリベルセプトヘーカ	ザルトラップ	大手術：28日間 軽度処置：7日間	28～42日経過かつ創傷治癒後	適正使用ガイド	消失半減期 (t1/2) : 4.81-5.54日
	テムシロリムス	トーリセル	14日間（半減期考慮）	創傷治癒を確認後	適正使用ガイド、米国添付文書	消失半減期 (t1/2) : 13.5-14.8時間 活性代謝物59.2-67.0時間
	ベバシズマブ	アバスチン	大手術：42～56日間 軽度処置：7日間	28日経過かつ創傷治癒後	適正使用ガイド	消失半減期 (t1/2) : 11.68-13.40日
	ラムシルマブ	サイラムザ	大手術：28日間 軽度処置：7日間	28日経過かつ創傷治癒後	適正使用ガイド	消失半減期 (t1/2) : 138-228時間

内服薬（一般名 五十音順）

薬効	一般名	商品名	術前休薬の目安	術後再開の目安	参考文献	備考
抗悪性腫瘍剤	アカラブルチニブ	カルケンス	3日間	3日間経過かつ創傷治癒を確認後	適正使用ガイド	消失半減期 (t1/2) : 単回 9.4時間 反復 1.8時間
	アキシチニブ	インライタ	1日間	大手術：術後2-3週間 小手術：術後7日	適正使用ガイド、米国添付文書	消失半減期 (t1/2) : 4.8-5.9時間
	アベマシクリブ	ベージニオ	7日間	骨髄抑制問題なければ再開	添付文書（明確な日数の記載なし）	消失半減期 (t1/2) : 16.3-27.5時間
	イブルチニブ	イムブルピカ	3-7日間	3-7日間	適正使用ガイド	消失半減期 (t1/2) : 4-9時間
	エベロリムス	アフィニートール	7日間（半減期考慮）	創傷治癒を確認後	適正使用ガイド（明確な日数の記載なし）	消失半減期 (t1/2) : 35.6-40.5時間
	カボザンチニブ	カボメティクス	28日間	大手術：28日間、軽度処置：7日間 かつ創傷治癒を確認後	適正使用ガイド	消失半減期 (t1/2) : 50-110時間
	ザヌブルチニブ	ブルキンサ	3-7日間	3-7日間	添付文書	消失半減期 (t1/2) : 1.7-3.87時間
	サリドマイド	サレド	1日間（半減期考慮）	術後離床・安定次第（VTE注意）	適正使用ガイド（明確な日数の記載なし）	消失半減期 (t1/2) : 4-5時間
	シロリムス	ラパリムス	7日間（半減期考慮）	創傷治癒を確認後	添付文書（明確な日数の記載なし）	消失半減期 (t1/2) : 47.7時間

薬効	一般名	商品名	術前休薬の目安	術後再開の目安	参考文献	備考
抗悪性腫瘍剤	スニチニブ	スーテント	7～10日間	創傷治癒を確認後	適正使用ガイド	消失半減期 (t1/2) : 49.5時間
	ソラフェニブ	ネクスバル	10日間	14日間経過かつ創傷治癒後	適正使用ガイド、米国添付文書	消失半減期 (t1/2) : 25.5時間
	チラブルチニブ	ベレキシブル	1日間（半減期考慮）	創傷治癒を確認後	添付文書（明確な日数の記載なし）	消失半減期 (t1/2) : 3.55-5.2時間
	ニンテダニブ	オフエブ	4日前（半減期考慮）	創傷治癒を確認後	添付文書（明確な日数の記載なし）	消失半減期 (t1/2) : 8.48時間 (活性代謝物6.1時間)
	パゾパニブ	ヴォトリエント	7日間	28日間経過かつ創傷治癒後 ＊米の添付文書では14日間	適正使用ガイド、米国添付文書	消失半減期 (t1/2) : 21.4-42.5時間
	パルボシクリブ	イブランス	7日間	骨髄抑制問題なければ再開	適正使用ガイド	消失半減期 (t1/2) : 23時間
	バンデタニブ	カブレルサ	28日間	14日間経過かつ創傷治癒を確認後	適正使用ガイド、米国添付文書	消失半減期 (t1/2) : 90.2-115時間
	ピルトブルチニブ	ジャイパーカ	3-5日間	3-5日間	添付文書	消失半減期 (t1/2) : 4.02-7.55時間
	フルキンチニブ	フリュザクラ	14日間	14日間経過かつ創傷治癒後	適正使用ガイド、米国添付文書	消失半減期 (t1/2) : 42-60時間
	ポマリドミド	ポマリスト	1日間（半減期考慮）	術後離床・安定次第（VTE注意）	適正使用ガイド（明確な日数の記載なし）	消失半減期 (t1/2) : 6-7時間
	レゴラフェニブ	スチバーガ	14日間	28日間経過かつ創傷治癒後	適正使用ガイド	消失半減期 (t1/2) : 27.4時間 活性代謝物M-2 24.8時間 活性代謝物M-5 60.8時間
	レナリドミド	レブラミド	1日間（半減期考慮）	術後離床・安定次第（VTE注意）	適正使用ガイド（明確な日数の記載なし）	消失半減期 (t1/2) : 2-3時間
	レンバチニブ	レンビマ	7日間 軽度処置：2日間	14日間経過かつ創傷治癒後	適正使用ガイド、米国添付文書	消失半減期 (t1/2) : 35.4時間

大手術：すべての腹部・骨盤部の手術などあるいは45分以上の腹部以外の手術を基本として、麻酔法、出血量、輸血量、手術時間などを参考として総合的に評価

軽度処置：針生検、CVポート設置、皮膚病巣の切除・生検など

2026.4.27 作成