

レジメン名	(大腸癌) ラムシルマブ+FOLFIRI	適応	大腸癌
		1クール日数	14日
		上限クール数	なし

【注射】		投与量\day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<<主管①>> 生理食塩液【100】mL/瓶 キープ用 中心静脈注射	1瓶		●													
<側管①> デキサート注射液【3.3】mg・1mL/管 デキサート注射液【1.65】mg・0.5mL/管 アロキシ静注 0.75mg・5mL/瓶 ポララミン注5mg・1mL/管 生理食塩液【100】mL/瓶 30分かけて 中心静脈注射	1管 1管 1瓶 1管 1瓶		●													
<側管②> 生理食塩液【50】mL/瓶 フラッシュ用 中心静脈注射	1瓶		●													
<側管③> ■サイラムザ点滴注射液 (100/500) テルモ生食【250】mL/袋 60分かけて 抗癌剤中心静脈注射(薬剤調製)	8mg/kg 1袋		●													
フィルター付輸液セット			●													
<側管④> 生理食塩液【50】mL/瓶 1時間かけて 経過観察用(1時間かけて:省略可) フラッシュ用 中心静脈注射	1瓶		●													
<側管⑤> ■イリノテカン塩酸塩点滴静注液「イイカ」 (40/100) 大塚糖液【5% 250mL】/瓶 2時間かけて 抗癌剤中心静脈注射(薬剤調製)	150mg/m <sup>2</sup> 1瓶		●													
<側管⑥> 生理食塩液【50】mL/瓶 フラッシュ用 中心静脈注射	1瓶		●													
<<主管②>> ■レボホリナート点滴静注用 (25/100) 大塚糖液【5% 250mL】/瓶 2時間かけて 主管①と付け替え、側管⑤と同時に開始 中心静脈注射(薬剤部調製)	200mg/m <sup>2</sup> 1瓶		●													
<側管⑦> ■フルオロウラシル注(5-FU) 主管②側管⑤終了後 抗癌剤中心静脈注射(薬剤調製)	400mg/m <sup>2</sup>		●													
<側管⑧> ■フルオロウラシル注(5-FU) 生理食塩液【50】mL/瓶 46時間かけて インフューザー使用 抗癌剤局所持持続注入(薬剤部調製)	2400mg/m <sup>2</sup> 0.6瓶		●●													
生理食塩液【20】mL/管 血管確保用 中心静脈注射	1管		●													
生理食塩液【500】500単位・5mL/筒 フラッシュ用 中心静脈注射	1筒		●													
【内服】			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
アプレピタントカプセル 125mg 1日1回 点滴の60~90分前	1錠		●													
アプレピタントカプセル 80mg 1日1回 朝食後	1錠			●	●											