

レジメン名	(乳癌) dd E C	適応				乳癌								
		1クール日数				14日								
		上限クール数				4クール								
【注射】		投与量\day	1					7	8					14
≪主管①≫ 生理食塩液【100】mL/瓶 キープ用 点滴注射		1 瓶	●											
<側管①> デキサート注射液【6.6】mg・1mL/瓶(デカトロン) デキサート注射液【3.3】mg・1mL/管(デカトロン) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg・50mL/袋 15分かけて 点滴注射		1 瓶 1 管 1 袋	●											
<側管②> 生理食塩液【50】mL/袋 フラッシュ用 点滴注射		1 袋	●											
<側管③> ■エピルピシン塩酸塩注射用 (ファルモルピシン)(10/50) ブドウ糖液【5% 100mL】/瓶 15分かけて 抗癌剤点滴注射(薬剤調製)		90mg/m ² 1 瓶	●											
<側管④> 生理食塩液【50】mL/袋 フラッシュ用 点滴注射		1 袋	●											
<側管⑤> ■エンドキサン注 (100/500) ブドウ糖液【5% 250mL】/袋 30分かけて 抗癌剤点滴注射(薬剤調製)		600mg/m ² 1 袋	●											
<側管⑥> 生理食塩液【50】mL/袋 フラッシュ用 点滴注射		1 袋	●											
【内服】			1	2	3	4		7	8					14
デカドロン錠 4mg 1日2回 朝 夕 食 後		2 錠		●	●	●								
【内服】			1	2	3	4		7	8					14
アプレピタントカプセル 125mg 1日1回 点滴の60～90分前		1 錠	●											
アプレピタントカプセル 80mg 1日1回 朝 夕 食 後		1 錠		●	●									
【内服】			1	2	3	4		7	8					14
ジブレキサ《ザイデリス錠》5mg 1日1回 夕 食 後		1 錠	●	●	●	●								
【注射】		投与量\day	1	2	3	4		7	8					14
ペグフィルグラスチムBS皮下注3.6mg/筒 皮下注		1 筒												

ペグフィルグラスチムは
day2~3のいずれかに
プロトコル外で医師が入力

乳/化療/≤2h